YJ 479006/03

전문의약품

유한 피라진아미드 250mg 정 500mg

피라진아미드정(약전)

〈622: 항결핵제〉

유한피라진아미드정은 PAS, INAH, Streptomycin에 뒤이어 개발된 항결핵제로서, 다른 약제로 인한 내성에 좋은 효과를 나타내며, 타 약물과의 병용투여로 좋은 효과를 나타냅니다. 특히, INAH와의 병용은 현저한 항균력의 증강을 보이며, INAH 단독 사용시보다 내성발현이 훨씬 지연됩니다.

【성분 · 함량】 1정중

피라진아미드(약전) ····· 250mg, 500mg

【성　　상】 백색의 원형정제

【효능 · 효과】

- 유효균종 : 결핵균
- 주효능 · 효과 : 폐결핵 및 기타결핵증

【용법 · 용량】

타항결핵제와 병용하십시오.

성인 : 피라진아미드로서 1일량 1.5~2.0g(250mg 6~8정, 500mg 3~4정)을 1~3회 분할 복용하십시오. 1일 최고 3g까지 증량할 수 있습니다.

소아 : 아직 용량이 확립되어 있지 않으나 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   간장애환자, 신장애환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 본인 또는 양친, 형제가 통풍발작(관절통)의 기왕력환자 또는 요산치 상승환자
   2) 간장애, 신장애의 의심이 있는 환자
3. 부작용 및 일반적 주의
   1) 간장 : 간장애가 나타나는 일이 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 있을 때는 투여를 중지하십시오.
   2) 관절 : 요산치상승, 통풍발작(관절통)이 나타날 수 있습니다.
   3) 혈액 : 때로 호산구증다증 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   4) 과민증 : 발열, 발진 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   5) 위장 : 식욕부진, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   6) 기타 : 때로 두통, 근육통, 색소침착이 나타날 수 있습니다.
4. 상호작용
   간장애를 일으키기 쉬운 약물과 병용할 경우는 주의하여 투여하십시오.

【저 장 방 법】 밀폐용기, 실온보존

【포 장 단 위】 250mg정 : 500정　　500mg정 : 100정

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

문안작성년월일 900122
문안개정년월일 950105

제조판매원
유한양행
본사 : 서울특별시 동작구 대방동 49의 6
공장 : 경기도 군포시 당정동 27의 3
대 표 전 화 : 828 - 0181
소비자상담실 : 080 - 024 - 1188
(수신자요금부담)