Vol 427799/05A

일반의약품

위염, 위·십이지장궤양에

알마겔® 현탁액·정

(알마게이트)

분류번호 234 : 제산제

개요 및 특징

알마겔은 Spain Almirall Prodesfarma사가 개발한 제산제로서 위·십이지장궤양은 물론 위염, 위산과다증 등에 좋은 효과를 발휘합니다.

1. **신속하고 지속적인 제산작용**
알마겔은 독특한 이중격자구조로 되어있어 신속하고 지속적인 제산효과를 나타낼 뿐 아니라 중화작용을 자동 조절하여 위내의 pH를 정상적으로 유지시켜 줍니다.

2. **항 펩신작용 및 담즙산 흡착·중화작용**
알마겔은 위산중화작용 뿐만 아니라 위로 역류해 들어와서 위장질환을 악화시키는 담즙산을 흡착, 중화하고 펩신의 활성을 저하시킵니다.

3. **낮은 sodium 함량**
알마겔은 sodium의 함량이 낮아 소금섭취를 제한해야 하는 고혈압, 심장질환환자 등도 안전하게 복용할 수 있습니다.

4. **높은 안정성**
알마겔의 제산작용은 단백질이나 펩신과 같은 단백분해효소에 의해 불활성화되지 않습니다.

성분·함량

현탁액 : 1포(15ml) 중
알마게이트(식약청고시) 1g
초산클로르헥시딘 0.003g

정 제 : 1정 중
알마게이트(식약청고시) 500mg

성 상

현탁액 : 점성이 있는 백색의 방향성 현탁액

정 제 : 백색의 원형 정제

앞면	뒷면	측면
AMG	YH	

효능·효과

다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선
: 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다(속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림), 역류성 식도염







용법·용량

· 성인 : 알마게이트로서 1회 1g (현탁액-1포 / 정제-2정), 1일 4회, 식후 1~2시간 및 취침시에 복용합니다.
(정제는 씹어서 복용합니다.)
· 소아(6-12세) : 성인용량의 1/2을 복용합니다.
· 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자는 신중히 복용하십시오.
다른 약을 복용하고 있는 환자
2. 부작용
소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.
3. 일반적 주의
① 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
② 소아에 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킵니다.
③ 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
4. 상호작용
① 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 함께 복용하지 않습니다.
② 이 약의 흡착작용 또는 소화관내·체액의 pH 상승에 의해 함께 복용한 약의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용합니다.
5. 저장상의 주의사항

① 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.



② 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.



③ 잘못된 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

저장방법 실온(1~30℃)보관, 현탁액-밀봉용기 / 정제-밀폐용기

사용기한 외부포장에 표기

포장단위 현탁액-100포 / 정제-10정, 500정

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품일 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

제조판매원
유한양행
본사 : 서울시 동작구 대방동 49-6
공장 : 경기도 군포시 당정동 27-3
www.yuhan.co.kr
대표전화 : 828-0181
소비자상담실 : 080-024-1188
(수신자 요금 부담)

원료공급원
Almirall Prodesfarma, Spain

설명서개정일 1998. 3. 5