※ 이 의약품을 사용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

위산과다 · 속쓰림에

# 안타신정

**500 정**

| 일반의약품 | 보험용 |
|---|---|

**코오롱제약주식회사**

공장 : 대전광역시 대덕구 문평동 48-5
http://www.kolonpharm.co.kr

**■성분 · 함량** : 1정 중

| | |
|---|---|
| 건조수산화알루미늄겔(약전) | 250mg |
| 탄산마그네슘(약전) | 160mg |

**■성상** : 백색의 타원형 정제

**■효능 · 효과** : 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림

**■용법 · 용량**

성인 1회 3정, 1일 3회 식후에 복용합니다.

**■사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에 투여하지 마십시오.
   투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 환자에 신중히 투여하십시오.
   1) 신장애 환자
   2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3. 부작용 : 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
   1) 장기연용을 하지 않습니다.
   2) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   3) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
   4) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
5. 소아에 대한 투여 : 이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않습니다.
6. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 서늘한 곳에 보관하십시오.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

PLBL ＊001 ATCT 052003

**■저장방법**

- 밀폐용기
- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

※의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

**■포장단위** : 100, 200, 500, 1000정

**■소비자상담**

소비자보호실 전화 :
080-203-6000 (수신자 요금부담)
이메일 : pharm@kolon.com

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

8 809023 482983

설명서 문안작성일 : 20020208
문안개정일 : 20030529

제조번호 :

사용기한 :

HDPE
분리배출