

위·십이지장 궤양 및 위염에

【분류번호 : 232】
【전문 의약품】

로시드정 150mg

(염산라니티딘)

LOCID Tablet 150mg

■성분·함량 : 1정 중

염산라니티딘 (유.에스.피.) 168mg
(라니티딘으로서 150mg)

■성 상 : 백색의 필름코팅정제

■효능·효과

1. 주효능·효과

위·십이지장궤양, Zollinger-Ellison 증후군, 역류성식도염, 마취전 투약(멘델슨증후군 예방), 수술후 궤양, 비스테로이드성 소염진통제(NSAID)투여로 인한 위·십이지장궤양
다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 급성위점막병변에 의한)

■용법·용량

1. 성인

라니티딘으로서 1회 150mg을 1일 2회, 오전 및 취침시에 경구투여합니다.

1) 위궤양 및 십이지장궤양

1회 150mg을 1일 2회 경구투여하거나 1회 300mg을 1일 1회 취침시에 투여합니다. 특히 십이지장궤양 환자에 1회 300mg을 1일 2회, 오전 및 취침시에 투여하면 보다 높은 치료율을 얻을 수 있습니다. 비스테로이드성 소염진통제 투여로 인한 궤양 또는 비스테로이드성 소염진통제 장기투여시 위·십이지장궤양 발생을 예방하기 위한 병용요법에 있어서도 용법·용량은 같습니다. 보통은 4주 이내, 비스테로이드성 소염진통제 투여로 인한 질환은 보통 8주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 연장될 수 있습니다. 이 약의 단기요법으로 효과가 우수하였던 재발성 궤양 환자들에 대해서는 유지요법으로 150mg을 1일 1회 취침시에 투여합니다.

2) 역류성 식도염

8주 동안 1회 150mg을 1일 2회 투여하거나, 1회 300mg을 1일 1회, 취침전에 투여합니다. 중증 역류성식도염 환자에 대해서는 1회 300mg을 1일 4회로 증량할 수 있습니다.

3) Zollinger-Ellison 증후군

초기용량으로서 1회 150mg, 1일 3회로 치료를 시작하며, 필요에 따라 증량할 수 있습니다. 중증 질환의 경우 의사의 지시에 따라 1일 6g까지 투여할 수 있습니다.

4) 소화성궤양, 급성스트레스궤양 및 급성위점막병변에 의한 상부소화관출혈의 경우에는 보통 주사제로 치료를 개시하고, 경구투여가 가능하게 된 후에는 경구투여로 바꾸어 1회 150mg을 1일 2회 투여합니다.

5) 마취전 투약(멘델슨증후군 예방)

마취유도 2시간전에 150mg을 투여합니다. 이 경우 수술전야에도 150mg을 투여하면 더욱 좋습니다.

2. 소아

소아에 대한 임상연구는 확립되어 있지 않으나, 8~18세의 경우 1회 150mg(체중kg당 2mg)을 1일 2회까지 투여할 수 있습니다.

3. 신장장애 환자

크레아티닌 청소율이 50mL/min 이하인 심한 신장장애 환자의 경우, 150mg을 1일 1회 취침시에 투여합니다. 이는 환자의 상태에 따라 투여간격을 12시간 또는 그 이상으로 늘릴 수 있습니다. 혈액투석은 약물의 혈중농도를 감소시키므로, 혈액투석 직후 투약계획을 재조정합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약에 과민증의 병력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 신장장애 환자(혈중농도가 지속되므로 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 사용하십시오)

2) 간장애 환자

3) 약물과민증의 병력이 있는 환자

4) 고령자

3. 부작용

1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.

2) 과민증 : 드물게 두드러기, 발진, 발열, 기관지경련, 저혈압 등의 과민반응, 맥관부종 등의

증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.

- 3) 혈액 : 몇몇 환자에서 과립구감소증, 혈청크레아티닌치 상승이 보고된 바 있으나 가역적이며, 드물게 백혈구감소증, 혈소판감소증, 골수형성부전, 재생불량성 빈혈과 함께 무과립구증, 범혈구감소증 매우 드물게 후천성 면역결핍성빈혈이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지합니다. 때때로 호산구증다증이 나타날 수 있습니다. 초기증상으로 전신권태감, 무력, 피하·점막출혈, 발열 등이 나타나면 혈액검사를 실시하여 이상이 인정되는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
 - 4) 간장 : 드물게 황달 때때로 일시적이고 가역적인 간기능장애(AST, ALT, γ -GTP, ALP치의 상승), 간염 등이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 즉시 투여를 중지합니다.
 - 5) 순환기계 : 드물게 서맥, 방실블록, 빈맥, 부전수축과 같은 부정맥이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 소화기계 : 때때로 변비, 설사, 드물게 구역, 구토, 복부팽만감, 복통, 급성 췌장염, 식욕부진이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 정신신경계 : 드물게 어지러움, 졸음, 가역적 혼돈상태, 경련, 두통, 두중, 불면, 흥분, 우울, 불안, 환각이 나타날 수 있습니다. 또한 드물게 가역적인 흐린시력과 무의식적인 운동장애가 보고되어 있습니다. 의식장애, 경련(강직성 등), 강대성근경련이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하거나 적절한 처치를 합니다. 특히 신기능 장애를 지니고 있는 환자에서 쉽게 나타날 수 있으므로 주의 합니다.
 - 8) 내분비계 : 여성형유방, 발기부전 및 성욕감퇴 등이 보고된 바 있으나, 이 약과의 인과관계는 확립되지 않았습니다.
 - 9) 근골격계 : 드물게 관절통이 나타날 수 있습니다. 근육통, 무력감, CK(CPK) 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈의 상승을 특징으로 하는 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지합니다.
 - 10) 피부 : 드물게 경미한 다형홍반을 포함하는 발진, 탈모가 보고된 바 있습니다.
 - 11) 기타 : 드물게 설염, 때때로 피부가려움이 나타날 수 있습니다. 기타 H₂수용체길항제에서 간질성신염, 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘증후군(중독성표피괴사증), 재생불량성빈혈, 방실차단 등의 심차단이 나타났다는 보고가 있습니다.
4. 일반적주의
- 치료에 있어서는 경과를 충분히 관찰하여 질환의 상태에 따른 치료상 필요한 최소한의 사용에 그치고 이 약으로 효과가 보이지 않는 경우에는 다른 요법으로 바꿉니다. 또한 혈액상, 간기능, 신기능 등에 주의하십시오.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
 - 2) 이 약은 모유중으로 이행하므로 수유부에 투여할 경우에는 수유를 중단합니다.
6. 소아에 대한 투여
- 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다)
7. 임상검사치에의 영향
- 시험지법에 의한 요단백 검사에서 위양성이 나타날 수가 있으므로 설폰살리실산법으로 검사하는 것이 바람직합니다.
8. 과량투여시의 처리
- 1일 6g까지 과량투여한 보고가 있었으나, 특히 중대한 영향을 나타나지 않았습니다. 이러한 경우에는 최토, 위세척을 하고 동시에 적절한 치료를 합니다. 필요하다면 혈액투석에 의해 제거합니다.
9. 기타
- 1) 위암증상을 은폐할 수 있으므로 악성이 아닌 것을 확인한 후 투여합니다.
 - 2) 동물의 흡수·배설시험에서 안구 멜라닌과의 친화성이 있다는 보고가 있으므로 장기투여시 안과적 검사를 하는 등 주의하여 투여합니다.

■저장방법 : 밀폐용기에 넣어 건냉암소에 보관합니다.

■사용기한 : 외부포장재에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■포장단위 : 10, 60, 100, 120, 300, 500정

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부분서 작성일(2005년 2월 16일)이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

♣제품문의 : 코오롱제약 소비자보호실 TEL. 080-203-6000 (수신자 요금부담)

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

설명서 문안작성일 : 19930901
문안개정일 : 20050216

 **코오롱제약주식회사**

공장 : 대전광역시 대덕구 문평동 48-5
<http://www.kolonpharm.co.kr>