KOSDAQ
코스닥등록법인

K.G.M.P
우수의약품지정업체

일반의약품

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 이 약에 과민증 환자
   2) 결핵 환자
   3) 임부, 수유부
   4) 황에 불내성 환자

2. 부작용
   1) 이 약중에 황이 함유되어 있으므로 위통 등의 소화기 질환의 가능성이 있다.

3. 일반적 주의
   1) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음사항을 고려한다.
      (1) 장기 투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 있을 경우 감량, 휴약등의 적절한 조치를 한다.
      (2) 약물 요법 이외의 치료법도 고려한다.
   2) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
      (1) 급성 염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
      (2) 원칙적으로 동일한 약품의 장기 투여는 피한다.
   3) 다른 소염 진통제와 병용은 피하는 것이 바람직하다.
   4) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용 발현에 특히 유의한다.

■ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(K.G.M.P)에 의한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

SINCE 1957
Binex
(주)바이넥스
서울시 영등포구 영등포동 1가 92-2
공 장 : 부산시 사하구 장림동 480-2

# 오라테오 캡슐

## 황산글루코사민

퇴행성 관절질환



Binex
(주)바이넥스

100 캡슐

| 일반의약품 | |
|---|---|
| 분류번호 | 114 |

**【원료약품의 분량】** 1캡슐 중

결정황산글루코사민 (식품의약품안전청고시) · · · · 312.5mg
(황산글루코사민으로서 250mg)

**【성 상】**

담황갈색의 분말이 충진된 상, 하 연녹색의 경질캡슐제

**【효능 · 효과】**

다음 질환에 사용할 수 있습니다.
골관절염(퇴행성 관절질환)

**【용법 · 용량】**

성인 : 황산글루코사민으로서 1회 500mg (2캡슐)
1일 3회 식전에 6주간 경구투여 하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감 하십시오.

**【저장방법 및 사용기간】**

기밀용기, 냉암소에 저장, 제조일로부터 36개월

**【포장단위】** 100캡슐, 200캡슐

「주의 – 부작용」

제조번호 : ED001

사용기한 : 08.03.31

8 806021 107030

http://www.bi-nex.com ☎ 080-263-3151

일반의약품

# ORATEO Capsule
# Glucosamine Sulfate