

프리카바 캡셀

FRICAVA Capsule

심한 기침, 해소, 천식의 종류는 많으나 발병 원인별로 대별하면 알레르기성 각종 질병, 기관지이상 및 직업병의 원인으로 인한 기침 해소 천식으로 분류할 수 있습니다. 그러나 심한 기침 해소 천식의 대부분은 알레르기성 천식과 각종 질병으로 인한 해소 천식이며 그 원인은 주로 심장질환, 기관지부종, 편도선염 및 기관지염 등이 원인이 되는 경우가 대부분입니다.

프리카바 캡셀은 심한 기침 해소 천식에 효과가 있는 약제중 가장 좋은 4가지 약제를 합리적으로 배합 제조한 제품으로 발작성 해소 천식의 응급약으로서뿐 아니라 급·만성 해소 천식의 발생원인을 치료하는 약제를 배합 제조함으로써 단독 약제를 사용하여 충분한 효과를 보지 못한 분에게도 다각적으로 작용하여 만족할만한 효과를 얻을 수 있도록 제조한 제품입니다.

【원료약품의 분량】 1 캡셀중

디프로필린 (Diprophyllyne) (B.P 80)	25mg
염산 메톡시페나민 (Methoxyphenamine HCl) (USP)	25mg
말레인산 클로르페니라민 (Chlorpheniramine Maleate) (약전)	2mg
노스카핀 (Noscapine) (약전)	5mg

【성 상】 백색의 가루가 들어있는 상의 황색, 하의 백색의 캡셀제

【약리작용 및 특징】

● Diprophyllyne (디프로필린)

관상혈관을 확장하여 심근에 혈액공급을 원활히 합니다. 이노작용에 의하여 기관지점막의 부종을 제거하고, 또 평활근의 긴장을 제거하는 작용이 있어, 기관지의 경련을 억제함으로 기관지 천식의 발생원인을 치료하는 약제를 배합 제조함으로써 단독 약제를 사용하여 충분한 효과를 보지 못한 분에게도 다각적으로 작용하여 만족할만한 효과를 얻을 수 있도록 제조한 제품입니다.

● Methoxyphenamine - HCl (염산메톡시페나민)

기관지 근육에 직접 작용하여, 기관지를 확장함으로 그 경련을 제거합니다. 따라서 천식 발작시의 호흡곤란을 완화하고, 해소를 진정시키고, 객담배출을 용이하게 합니다. 또한 항알레르기 작용도 있습니다.

● Noscapine (노스카핀)

구심성 해소사각의 전달을 약화시키고, 해소중추의 반사흥분을 억제할 뿐 아니라, 파파베린 같이 평활근의 이완작용에 의하여 기관지 평활근의 긴장을 제거함으로서, 진해작용을 발휘합니다. 특히 발작시의 심한 해소나 경련성 해소에 유효합니다.

● Chlorpheniramine Maleate (말레인산 클로르페니라민)

부작용이 적은 항히스타민제로서 미주신경을 흥분시키는 히스타민이나 히스타민 유사 물질에 길항하여 기관지 경련을 없애주며 점막의 종장과 점액의 분비항진을 억제하여 알러지성 천식을 제거하는 작용을 합니다.

【효능·효과】

아래 질환을 수반하는 해소, 기관지천식 (중증발작시는 제외), 급성기관지염, 만성기관지염, 상기도염, 감기, 천식성기관지염, 기도폐쇄증상.

【용법·용량】

성인1회 2-3캡셀, 1일3회 식후에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 녹내장 환자
 - 2) 전립선비대 등 배뇨장애 환자
 - 3) 크산틴계 약물에 대한 심한 부작용의 병력이 있는 환자
 - 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 갑상선기능항진증 환자
 - 2) 급성 신염 환자
 - 3) 당뇨병 환자
 - 4) 간질 환자
 - 5) 심질환 환자
 - 6) 고혈압 환자
- 부작용
 - 1) 순환기계 : 때때로 심계항진, 부정맥 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 정신신경계 : 신경과민, 초조감, 두통, 오한, 불면, 졸음, 발한, 어지러움, 불쾌, 불안, 위화감, 열감 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 눈 : 복시 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 소화기계 : 구역, 구토, 식욕부진, 복통, 변비, 가슴쓰림, 구갈, 때때로 설사 등이 나타날 수 있다.
 - 5) 과민증 : 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 6) 비뇨기계 : 다뇨, 배뇨장애 등이 나타날 수 있다.
 - 7) 혈액 : 혈소판감소증, 무과립중, 재생불량성 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 일반적 주의
 - 1) 과도한 투여를 계속하는 경우 부정맥 또는 심정지를 일으킬 수 있으므로 충분히 주의한다.
 - 2) 용법·용량에 맞게 투여하여도 효과가 나타나지 않는 경우에는 이 약이 적당하지 않은 것으로 생각하고 투여를 중지하며 경과를 충분히 관찰한다.
 - 3) 이 약을 투여하는 동안 졸음 등이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 상호작용
 - 1) 이 약을 에피네프린, 이소프로테레놀 등의 카테콜아민류와 병용투여시 부정맥 또는 심정지를 일으킬 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
 - 2) 다음 약물과 병용투여시 상호작용이 증가될 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다. : 중추신경억제제, MAO 저해제
- 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 냉장소 보관, 3년

【포장단위】 60, 120, 500, 1,000캡셀

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기간 또는 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

