

포 리 라 제 정

현대 사회가 고도의 문화사회로 변천됨에 따라 사람의 생활도 복잡성을 탈피할 수 없으므로, 많은 에너지와 영양소가 요구됩니다. 따라서 사람의 건강의 원천인 위장기능이 원활하여 섭취한 음식을 충분히 소화시켜 건강한 생활에 필요한 에너지와 영양분을 충분히 공급하여야 할 것입니다.

그러나 위장기능이 원활하지 않아 섭취한 음식을 완전히 소화하여 영양분을 공급받지 못하면 자연히 체력이 약해지기 쉽기 때문에 무엇보다 위장기능이 튼튼하여야 할 것입니다.

포리라제정은 섭취한 음식물의 충분한 소화는 물론 위부팽만감, 위산과다, 위통 및 식욕감퇴 증도 치료할 수 있도록 처방 제조된 위장병 치료제입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

다이젤 100(KPC)		3.75mg	
{ 알파아밀라제	375Unit	}	
	베타아밀라제		45Unit
	프로테아제		375Unit
탄산마그네슘(KP)		80mg	
탄산수소나트륨(KP)		250mg	
스코폴리아엑스(KP)(히요시아민으로서 0.0375mg)		7.5mg	
황색4호 (타르색소 고시)		1.0mg	
식약청 인정 타르색소 (타르색소 고시)		적량	

【성 상】 연녹색의 타원형(장방형)의 필름 코팅정

【약리작용과 특징】

- ※ 포리라제정에는 소화효소제인 아밀라제와 프로테아제의 소화력을 최대로 발휘하도록 처방된 제품입니다. 섭취된 음식을 완전소화시킴으로 소화불량(과식·과음·식체)은 물론 식욕감퇴 등을 치료합니다.
- ※ 포리라제정에는 부교감 신경 차단제와 제산제가 이상적으로 배합되어 있으므로 위액 중의 과다한 산을 중화하고 산의 과다분비를 억제하여 위산과다 등을 치료합니다.
- ※ 포리라제정은 소화효소제와 부교감 신경 차단제 및 제산제가 이상적으로 배합되어 있으므로 섭취한 음식물에 정상적인 소화작용을 하므로 위부불쾌감, 위부 팽만감은 물론 구토나 위통을 치료합니다.

【효능 및 효과】 위산과다(위염, 위 십이지장궤양에 관련된 것도 포함), 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 소화촉진

【용법 및 용량】 성인 1회 2정, 1일 3회 식간에 복용한다.

【사용상 주의사항】

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 이상반응
 - 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 2) 이 약을 투여하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 수 있다.
 - 3) 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 2정 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 상호작용 - 위장진통 - 진경제와 병용투여하지 않는다.
- 소아에 대한 투여 - 이 약은 7세 미만의 영·유아에게 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
- 적용상의 주의 - 본 제제는 황색 4호를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알러지 경력이 있는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의할 것.

【포장단위】 자사포장단위 **【저장방법 및 사용기간】** 기밀용기, 제조일로부터 24개월

※ 본 의약품은 우수의약품제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 <http://www.anampharm.com>과 (Tel : 053-856-7711) 에서 확인할 수 있음

