

자이드 캡슐

Zaide Caps (니푸록사지)

자이드캡슐은 프랑스에서 개발한 정장 · 지사제로 수많은 임상실험에 의해 그 효과와 안정성이 인정되어 약 30여 개국에서 처방, 사용되고 있습니다.

자이드캡슐은 장질환을 일으키는 그람 양성균 및 음성균에 광범위한 항균작용을 나타내어 설사를 신속히 멈추게 할 뿐만 아니라, 장 정상 세균총의 평형을 회복시켜 줌으로서 정장효과를 발휘합니다. 또한 타 제제와의 교차내성이 없고 내약성이 좋은 특징을 가지고 있습니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐중

니푸록사지(Nifuroxazide)(고시) 200mg

【성상】 황색분말이 든 청색, 하단은 백색의 경질캡슐

【약리작용】

니푸록사지는 장내 정상 세균총은 파괴하지 않으면서 설사의 주원인균(E Coli Shigella, Salmonella, Staphylococcal Enterococci 등)에 대하여 정균작용(Bacteriostatic activity) 및 살균작용(Bactericidal activity)을 나타내며, 혈관내로 흡수되지 않고 장관내에서만 약리작용이 발현되므로 전신적인 부작용을 나타내지 않습니다.

【임상적 특징】

1. 광범위한 항균효과를 나타냅니다.
2. 정장효과를 발휘합니다.
3. 교차내성을 일으키지 않으며 항생제 내성인 균주에 대하여 높은 감수성이 있습니다.
4. 비교적 부작용이 없고 내약성이 좋습니다.
5. 금기사항 및 약물상호작용이 없습니다.

【효능 및 효과】 급성 세균성 설사

【용법 및 용량】

성인 : 니푸록사지으로서 1회 200mg 1일 4회 경구투여한다.

7일이상 투여하지 않는다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

투여기간동안 수분을 공급하고 그 정도와 공급방법은 설사의 심각도, 환자의 나이와 상태에 따라 조절한다.

【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 니트로푸란 유도체에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 미숙아 및 1개월 미만의 신생아
2. 부작용 - 알레르기반응이 나타날 수 있다.
3. 일반적 주의 - 침습의 임상증상을 수반하는 감염성 설사의 경우 일반적으로 항생물질투여를 고려한다.

【포장단위】 100, 200, 500, 1000캡슐

【사용방법 및 사용기간】 기밀용기, 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수약품제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기간 또는 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 <http://www.anampharm.com>과 (053-856-7711~5) 에서 확인할 수 있음



이 남 제 약

서울 : 서울특별시 동대문구 답십리동 488-338
공장 : 경북 경산시 진량읍 신성리 1204
TEL : (053)856-7711-5