

졸리지 않는 항히스타민제



카이진정

(Cetirizine Hydrochloride)

일반분류번호
141

【성분·함량】 1정 중

염산세티리진(E.P.).....10.0mg

【성상】

백색의 타원형 필름 코팅정제

【약리작용 및 특징】

1. 카이진정은 흡수가 빠르고 작용 발현이 매우 신속하기 때문에 각종 알러지 증상에 우수한 치료효과를 발휘합니다.
2. 카이진정은 기존의 항히스타민제와는 달리 말초의 Hi-Receptor에만 선택적으로 작용하므로 졸음과 진정 작용등의 부작용이 거의 나타나지 않습니다.
3. 카이진정은 1일 1회 1정의 복용으로 충분한 효과를 발휘하므로 복용이 간편합니다.

【효능·효과】

계절성 알레르기로 인한 비염, 결막염, 다년성 비염, 가려움, 만성 특발성 두드러기

【용법·용량】

6세 이상 소아 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정(염산세티리진으로서 10mg)
부작용에 민감한 환자의 경우는 5mg씩 아침, 저녁에 나누어 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 히드록시진에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 2) 신부전 환자
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 4) 6세 미만의 유아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 신장장애 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
 - 2) 간장애 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
 - 3) 고령자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
3. 부작용
 - 1) 정신신경계 : 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 드물게 가볍고 일시적인 다른 환, 피로, 어지러움 두통, 흥분이 나타날 수 있다.
 - 2) 소화기계 : 때때로 구갈, 구순건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 소화불량, 복통, 위통, 복부불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순염, 미각이상 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 순환기계 : 드물게 빈맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 4) 혈액 : 맥관염, 때때로 백혈구 감소, 호중구 감소, 림프구 증가, 호산구 증가, 드물게 단구증가, 혈소판 증가가 나타날 수 있다. 또한 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 한다.
 - 5) 과민증 : 광과민증, 아나필락시 쇼크, 때때로 부종, 드물게 발진, 가려움, 맥관부종이 나타날 수 있다.
 - 6) 신 : 드물게 흐린시력, 결막출혈이 나타날 수 있다.
 - 7) 간 : 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈, γ-GTP, LDH의 상승 등 간기능 장애(초기증상 : 전신권태감, 식욕부진, 발열, 구역 등), 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 8) 신장 : 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요잠혈이 나타날 수 있다.
 - 9) 기타 : 인두염, 기침, 비출혈, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 흥동, 드물게 월경불순, 이명이 나타날 수 있다.

(뒷면이어짐)

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온보관(1~30℃) 사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

* 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (K.G.M.P.)적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과 되었거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831



대우약품공업주식회사

부산광역시 사하구 신평동 579번지
http://www.daewoopharm.com

D0409

4. 일반적 주의
건강한 지원자에게 1일 20~25mg을 투여한 결과, 민첩성이나 반응시간에 어떠한 부작용도 나타내지 않았으나 운전이나 기계조작시에는 용량을 초과하지 않는다.
5. 상호작용
다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여 하지 않는다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 동물실험결과 기형발생이 보고된 바 없으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 않는다.
 - 2) 이 약이 모유를 통해 미량 분비되므로 투여중에는 수유를 중단한다.
7. 소아에 대한 투여
6세 미만의 유아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않는다.
8. 고령자에 대한 투여
이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에는 혈중 농도 과다 상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량하거나 휴약하고 적절한 처치를 한다.
9. 과량투여시의 처치
과량 투여시의 증상은 진정이다. 이 경우 위세척을 실시한다.
10. 임상검사치에의 영향
이 약은 알레르기항원피내반응을 억제하므로 알레르기항원피내반응검사를 실시하기 3~5일 전에는 이약을 투여하지 않는 것이 바람직하다.
11. 기타
증상에 따라 이약으로서 1일 10mg투여로 개선이 없을 경우, 의사 또는 약사의 지시에 따라 1일 20mg까지 투여한 임상보고가 있다.