분류번호 : 233 **일반의약품**

속쓰림·위통·위불쾌감

에마홈 정

EMAHOME Tab.

※본제품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 설명서는 의약품과 함께 보관하십시요

복잡한 현대생활에 의한 정신적·불규칙적인 식생활 및 외부자극등은 위장의 부담을 가중시켜 소화불량, 속쓰림, 위통등 여러 가지 불쾌한 증상을 일으킵니다.
에마홈 정은 이와같은 위장질환의 증상을 신속히 개선하도록 여러 가지 성분을 합리적으로 배합한 종합위장약으로서 음식물의 소화흡수를 촉진하고, 위의 운동과 분비질환에 우수한 효능을 나타내는 새로운 위장약입니다.

■ **성분·함량**

1정 중

메칠메치오닌설포늄클로리드 (식품의약품안전청고시)	12.5mg
히드로탈시트 (비·피)	70.0mg
(산화알루미늄으로서	11.66mg)
(산화마그네슘으로서	27.51mg)
탄산수소나트륨 (약전)	250.0mg
메타규산알루민산마그네슘 (건조물로서)(식품의약품안전청고시)	75.0mg
(산화알루미늄으로서	24.23mg)
(산화마그네슘으로서	9.53mg)
(이산화규소로서	24.30mg)
스코폴리아엑스3배산 (별규)	15.0mg
(총알카로이드로서	0.05mg)
호프건조엑스 (14→1) (별규)	5.0mg
겐티아나건조엑스 (10→1)(별규)	13.5mg
비오디아스타제2000(별규)	5.0mg
(α 아밀라제 2,000단위, S-아밀라제	260단위)

■ **성 상** : 연녹색의 필름코팅정제

■ **효능·효과**

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식, 소화촉진

■ **용법·용량**

성인 : 1회 2정
소아 : 1회 11~14세 1~2정, 8~10세 1정
1일 3회 식후에 복용한다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 말것.
   투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 인산염 저하가 있는 환자
   2) 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
   3) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3. 부작용
   1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
   2) 이 약을 투여하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 수 있다.
   3) 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   1)장기연용을 하지 않는다.
   2)신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.
   3) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
   4) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
   5) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
5. 상호작용
   위장진통·진경제와 병용투여하지 않는다.
6. 소아에 대한 투여
   이 약은 7세미만의 영·유아에게 투여하지 않는다.
7. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

■ **저장방법** : ㅇ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
ㅇ 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.
ㅇ 기밀용기,실온(1~30℃)보관.

■ **포장단위** : 10, 100, 200, 500정

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

930611, 030915
EHT 201-06

아주약품공업주식회사

본사 : 서울특별시 구로구 신도림동 413-13번지
공장 : 경기도 평택시 모곡동 439번지
소비자상담실 : 080-256-8000