분류번호 : 222 일반의약품

호흡기질환 치료제

앰브로캡슐

(염산암브록솔) AMBRO

※ **본제품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 설명서는 의약품과 함께 보관하십시요**

■ **성분 · 함량** : 1캡슐 중
염산암브록솔(식품의약품안전청고시) ····· 30mg

■ **성 상** : 백색의 과립이 충진된 상부 초록색, 하부 미황색의 경질 캡슐제

■ **효능 · 효과**
1.주효능 효과
점액분비장애로 인한 급 · 만성 호흡기질환 : 급 · 만성기관지염, 천식성기관지염, 부비강염, 건성비염

■ **용법 · 용량**
성인 : 염산암브록솔로서 1회 30mg 1일 3회 경구투여한다. 계속 치료시 1회 30mg 1일 2회 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ **사용상의 주의사항**
1.다음 환자에게는 투여하지 말 것
이 약에 과민증 환자
2.다음 환자에게는 신중히 투여할 것
중증 신장애 환자
3.부작용
1)소화기계 : 드물게 위부불쾌감, 위 · 복부팽만감, 위 · 복통, 설사, 변비, 구역, 구토, 가슴쓰림, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
2)과민증 : 드물게 발진, 두드러기, 두드러기양 홍반, 가려움, 안면종창, 호흡곤란, 오한을 수반한 체온상승 등이 나타날 수 있다. 극히 드물게 암브록솔과의 관련성에 상관없이 중증의 급성 아나필락시스양 반응이 나타났다는 보고가 있었으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
3)호흡기계 : 백혈구증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있다.
4)기타 : 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있다.
4.상호작용
에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린 등의 항생물질과 병용투여시 폐조직에서의 항생물질의 작용을 증강시킬 수 있다.
5.임부 및 수유부에 대한 투여
임신중 및 수유부에 대한 투여시 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. (특히, 임신초기 3개월이내에는 투여하지 않는다.)
6.고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

■ **저장방법**
○ 기밀용기
○ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
○ 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다

■ **포장단위** : 10,100, 500캡슐

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

910404, 040513
AMC 201-08

아주약품공업주식회사
본사 : 서울특별시 구로구 신도림동 413-13번지
공장 : 경기도 평택시 모곡동 439번지
소비자상담실 : 080-256-8000