분류번호 : 239 **일반의약품**

소화관 운동조절제

마부탄정

(말레인산트리메부틴) MABUTAN

마부탄 정은 만성위염, 위·십이지장궤양등의 질환에 수반되는 각종 소화기 증상 (복부동통, 오심, 복부 팽만감 등)의 치료에 우수한 효과를 나타내는 소화관 운동 조절제입니다. 이미 소화기능에 대한 약물군이 다수 개발시판되어 왔으나, 기존의 약제는 소화기능을 촉진 또는 억제하는 등의 한가지 작용만을 나타냈던 것에 반해, 마부탄 정은 생리상태에 의한 소화관 운동에 대해 촉진과 억제의 양면 효과를 나타냅니다. 즉 소화관질환 환자의 위유문부 운동에 대해 소화관 운동 항진시에는 운동억제를, 저하시에는 운동항진을 나타내어 그 치료효과가 더욱 기대되는 약제입니다. 마부탄 정은 위장관 연동운동을 유발시켜 이상운동기능패턴을 정상적인 생리상태로 회복시킬 뿐 아니라, 만성 위염 환자에 대해 위배출능 개선 및 위액 분비량을 억제시키고, 직접적 평활근 이완작용을 지녀 위장관의 운동장애에 의해 유발되는 질환의 치료에 탁월한 효과를 발휘합니다.

■ **성분 · 함량**

1정 중

말레인산트리메부틴 (식품의약품안전청고시)····· 100mg

■ **성 상** : 미황색의 원형정제

■ **효능 · 효과**

1.주효능효과

1)식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)

2)과민성대장증후군 및 경련성 결장

3)소아질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사), 동요자극, 수면장애

■ **용법 · 용량**

성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다.

연령 · 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ **사용상의 주의사항**

1.부작용

1)소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있다.

2)순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.

3)정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통등이 나타날 수 있다.

4)간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.

5)과민증 : 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

2.임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

3.수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **포장단위** : 100 ,1000정

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질,변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

931227, 030221
MBT 201-04

아주약품공업주식회사

본사 : 서울특별시 구로구 신도림동 413-13번지
공장 : 경기도 평택시 모곡동 439번지
소비자상담실 : 080-256-8000