분류번호 : 122 **전문의약품**

근 이 완 제

엑 손 정

(염산에페리손) EXON

※본제품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 설명서는 의약품과 함께 보관하십시오

■ **성분 · 함량**

1정 중

염산에페리손(식품의약품안전청고시) ····· 50mg

■ **특장점**

1)엑손정은 척수반사를 억제하여 항진된 골격근 긴장상태를 완화시키고 혈관 이완 및 혈류 증가 작용으로 근경축으로의 진행을 억제합니다.

2)엑손정은 척수의 통각 전달물질인 substance P에 길항하여 동통반사 억제작용을 나타냅니다.

3)엑손정은 뇌졸중 환자등 경성 마비에 적용시 근력을 저하시키지 않으면서 팔 · 다리 수의운동을 원활하게 해줍니다.

4)엑손정은 진정 · 최면작용 등의 부작용이 매우 적은 안전한 근이완제입니다.

■ **성상** : 백색의 원형 당의정

■ **효능 · 효과**

1.근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경견완증후군, 견관절주위염, 요통

2.신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌 · 척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 축색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수시신경병변, 기타의 뇌척수질환

■ **용법 · 용량**

성인 : 염산에페리손으로서 1회 50mg, 1일 3회 식후에 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ **사용상의 주의사항**

1.다음 환자에는 투여하지 말 것.

1)이 약에 과민증 환자

2)중증의 근무력증 환자

2.다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1)약물과민증의 병력이 있는 환자

2)간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다.)

3.부작용

1)쇽 : 드물게 쇽을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2)간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.

3)신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.

4)혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상아 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.

5)과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다.

6)정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있다.

7)소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.

8)비뇨기계 : 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있다.

9)전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있다.

10)기타 : 때때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있다.

4.일반적 주의

1)이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지한다.

2)졸음, 주의력 · 집중력 · 반사운동력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여 중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5.상호작용

이 약의 유사약물인 염산톨페리손과 메토카르바몰을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.

6.임부 및 수유부에 대한 투여

1)임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다.

2)수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.

7.소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).

8.고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

■ **저장방법**

○ 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

○ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

○ 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다

■ **포장단위** : 100, 200, 300, 500, 1000정

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

980820, 030830
ENT 201-06

아주약품공업주식회사

본사 : 서울특별시 구로구 신도림동 413-13번지
공장 : 경기도 평택시 모곡동 439번지
소비자상담실 : 080-256-8000