일반의약품

■ **원료약품의 분량**(1정중)
염산암브록솔 (고시)·····30mg

■ **성 상** : 백색의 원형정제

■ **효능 · 효과** : 점액 분비장애로 인한 급 · 만성 호흡기 질환 :
급 · 만성 기관지염, 천식성 기관지염, 부비강염, 건성비염

■ **용법 · 용량** : 성인 : 염산암브록솔로서 1회 30mg, 1일 3회
경구투여합니다. 계속 치료시 1회 30mg, 1일 2회 투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오

■ **사용상의 주의사항**

1. **다음 환자에는투여하지 마십시오.** - 이 약에 과민증 환자
2. **다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.** - 중증 신장애 환자
3. **부작용**
   1) 소화기계 : 드물게 위부불쾌감, 위 · 복부팽만감, 위 · 복통, 설사, 변비, 구역, 구토, 가슴쓰림, 식욕부진 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 과민증 : 드물게 발진, 두드러기, 두드러기양 홍반, 가려움, 안면종창, 호흡곤란, 오한을 수반한 체온상승 등이 나타날 수 있습니다. 극히 드물게 암브록솔과의 관련성에 상관없이 중증의 급성 아나필락시스양 반응이 나타났다는 보고가 있었으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
   3) 호흡기계 : 백혈구 증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있습니다.
   4) 기타 : 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있습니다.
4. **상호작용** : 에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린 등의 항생물질과 병용투여시 폐조직에서의 항생물질의 작용을 증강시킬 수 있습니다.

진해 · 거담제

록솔정

염산 암브록솔

1000정

KGMP 적격업체제품

0208

5. **임부 및 수유부에 대한 투여**
임신중 및 수유부에 대한 투여시 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
(특히, 임신초기 3개월 이내에는 투여하지 않습니다.)
6. **고령자에 대한 투여**
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

■ **저장방법** : 밀폐용기

■ **포장단위** : 1000정

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

제조번호:

사용기한:

samA 삼아약품주식회사
경기도 의왕시 오전동 265
대 표 전 화 (02)2056-7200
소비자상담실 (02)2056-7272
www.samapharm.co.kr

8 806100 320244