

고혈압 · 심부전 치료제

에나그랩정

(말레인산 에날라프릴)

고혈압(hypertension)은 원인불명의 본태성고혈압이 대부분이고 그외에 발생기전이 뚜렷한 속발성 고혈압이 있는데 이의 가장 큰 원인은 세동맥의 수축결과 말초저항이 증가하기 때문이라고 알려져 있습니다.

한편 근래 고혈압의 원인으로 신장 Renin-Angiotensin-Aldosterone계가 주목되고 있으며 ACE억제 작용을 통한 고혈압 치료가 보다 진보된 개념으로 연구되어졌습니다. 단백분해효소인 renin은 angiotensinogen을 분해하여 혈압상승물질인 angiotensin I을 만들고 이 angiotensin I은 ACE(Angiotensin Converting Enzyme)에 의해 강력한 혈관수축물질인 angiotensin II로 전환됩니다. 이로 인해 혈압이 상승되며, 더욱이 angiotensin II는 adrenal cortex로부터 aldosterone의 과잉분비를 유도하여 Na 축적과 K 배설을 촉진하며, 이로인해 혈류량의 증가와 체내 수분 저류를 촉진하게 됩니다.

에나그랩은 Enalapril maleate를 주원료로 하는 고혈압치료제로 근래 개발된 Angiotensin전환 효소 저해제(ACE저해제)입니다. 종래의 강압제가 가지는 작용과는 달리 혈압을 올리는 물질의 생성을 억제하고 그 작용시간이 긴 지속성 강압제입니다. 즉, 에나그랩은 ACE를 억제하여 고혈압의 원인이 되는 Angiotensin II와 Aldosterone의 생성을 억제함으로써 본태성 고혈압, 신혈관성 고혈압에 유효하며 만성심부전에도 효과가 있는 것으로 임상시험에서 확인되었습니다.

【원료약품 및 분량 : 1정중】

에나그랩정 5mg : 말레인산에날라프릴 (USP) 5 mg
에나그랩정 10mg : 말레인산에날라프릴 (USP) 10 mg

【성 상】

에나그랩정 5mg : 황색의 원형정제
에나그랩정 10mg : 적갈색의 원형정제

【효능 · 효과】

1. 고혈압
2. 심부전 : 이노제 및 디기탈리스 투여시의 보조치료제

【용법 · 용량】

1. 고혈압
 - 1) 이노제를 투여받고 있지 않은 환자
성인 : 말레인산에날라프릴로서 초회량으로 1일 1회 5mg을 투여하고 혈압에 따라 조절한다. 유지량으로 1일 10~40mg을 1~2회 분할 투여한다. 1일 1회 투여받는 환자에서 투여말기에 혈압강하작용이 감소되는 경우에는 용량을 증가하거나 1일 2회 투여한다.
 - 2) 이노제를 투여받고 있는 환자
성인 : 최근에 이노제 투여로 고혈압 치료를 받은 환자에서 이 약의 최초 투여시 저혈압이 나타날 수 있으므로 가능한 한 이 약 투여 2~3일 전에 이노제의 투여를 중지하며, 만약 이 약 투여시 고혈압 치료가 안 될 경우에는 이노제의 투여를 재개할 수 있다. 이노제 투여를 중지할 수 없을 경우에는 이 약을 1일 1회 2.5mg을 경구 투여한다.
 - 3) 신기능장애 환자
 - ① 일반적인 투여량은 크레아티닌 청소율이 30ml/분 이상(혈청크레아티닌이 3mg/dl까지)인 환자에 적용한다.
 - ② 크레아티닌 청소율이 30ml/분 이하(혈청크레아티닌이 3mg/dl 이상)인 환자 : 초회량으로 1일 1회 2.5mg을 투여한다. 혈압이 조절될 때까지 1일 최대 40mg까지 투여할 수 있다.

신기능 상태	크레아티닌 청소율(ml/분)	초회량(mg/일)
정 상	>80ml/분	5mg
경증의 손상	>30, ≤80ml/분	5mg
중증도-중증의 손상	≤30ml/분	2.5mg
투석 환자		신장 투석을 한날 2.5mg

※ 신장투석을 하지 않았을 경우에는 혈압반응에 따라 용량을 결정한다.

2. 심부전

- 1) 이 약은 이노제 및 디기탈리스의 보조치료제로 사용한다.
- 2) 초회량
성인 : 1회 2.5mg 1일 1~2회 투여한다. 최초투여후 2시간이상 및 혈압이 안정될 때까지 충분히 관찰하고 가능하면 저혈압이 나타나지 않도록 이노제의 양을 감소시킨다. 이 약의 최초투여후 저혈압이 나타나면 계속해서 주의깊게 용량을 조절하고 저혈압에 대하여 효과적으로 관리한다.
- 3) 유지량
성인 : 1일 5~20mg을 2회 분할투여하며 1일 최대 40mg까지 투여할 수 있다. 대부분의 환자에게 1일 최대투여량인 40mg을 투여한 대조시험에서 1일 1회 투여로 유효성있는 효과를 얻었으나, 1일 2회 투여시험이 일반적으로 많이 행하여졌으며 중증의 심부전환자(NYHA class IV)를 대상으로 하여 사망률감소가 확인되었던 위약-대조군시험에서도 대부분의 환자들은 1일 2.5~40mg을 2회 분할 투여받았다. 혈액동력학적 반응 또는 임상반응에 따라 투여량을 조절할 수 있다.
- 4) 신부전 또는 저나트륨혈증을 수반하는 심부전 환자
저나트륨혈증(혈청나트륨농도 130mEq/l 이하) 또는 혈청크레아티닌이 1.6mg/dl이상인 심부전환자에는 초회량으로 1일 2.5mg을 충분히 관찰하면서 투여한다. 용량을 증량할 경우에는 1회 2.5~5mg 1일 2회 또는 필요시 그 이상 증량투여하며 증량 투여 간격은 최초투여후 4일 또는 그 이상동안 과도한 저혈압 또는 특별한 신기능장애가 나타나지 않을 경우에 증량투여한다. 1일 최대 40mg까지 투여할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 2) 아크릴로니트릴설폰산나트륨 막을 이용한 혈액투석을 시행중인 환자
 - 3) 혈관부종 및 그 병력이 있는 환자
 - 4) LDL분리반출법치료를 받고 있는 환자(텍스트란황산셀룰로오스를 이용한 LDL분리반출법을 시행중인 환자)
 - 5) 원발성 고알도스테론혈증 환자
 - 6) 대동맥판협착증 또는 폐쇄성 박출장애 환자
 - 7) 원발성 간질환 및 간기능장애 환자
 - 8) 신장 이식 후 환자
 - 9) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 10) 소아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 중증의 신기능장애 환자(크레아티닌 청소율이 30ml/분 이하, 또는 혈청크레아티닌이 3mg/dl 이상)의 경우에는 감량투여하거나 투여간격을 연장하는 등 신중히 투여한다.
 - 2) 신혈관성 고혈압(특히 양측 또는 단측의 신동맥협착증) 환자
 - 3) 뇌혈관장애 환자(과도한 혈압강하가 뇌혈류부전을 일으켜 상태를 악화시킬 수 있다.)
 - 4) 단백뇨 환자(1일 1g 이상)
 - 5) 중증의 고혈압 환자



- 6) 중증의 전해질장애 환자
- 7) 면역반응이상 및 교원병 환자
- 8) 고령자

3. 부작용

- 1) 신장 : 때때로 BUN · 혈청크레아티닌상승, 드물게 급성 신부전이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여를 중지하는 등의 적절한 처치를 한다.
- 2) 혈액 : 때때로 해모글로빈, 헤마토크리트감소 및 드물게 백혈구감소, 혈소판감소, 호산구증가, 항핵항체(ANA)양성이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여를 중지하는 등의 적절한 처치를 한다.
- 3) 과민증 : 드물게 호흡곤란을 수반한 안면 · 혀 · 성문 · 인두의 종창을 증상으로 하는 혈관 신경성 부종이 나타날 수 있으며, 진선, 광과민증, 조갑박리, 박리성 피부염, 피부점막안 증후군(Stevens-Johnson 증후군)이 나타났다는 보고가 있으므로 이러한 경우에는 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여 중지 등의 적절한 처치를 한다.
- 4) 피부 : 때때로 발진, 가려움, 드물게 두드러기, 다한, 탈모가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여 중지 등의 적절한 처치를 한다.
- 5) 정신신경계 : 때때로 어지러움, 두통, 불안, 우울, 수면장애 드물게 졸음, 의식소실 등이 나타날 수 있다.
- 6) 순환기계 : 드물게 심계항진, 저혈압, 기립성 저혈압, 흉통, 빈맥, 서맥, 협심증, 일과성 허혈발작, 심근경색 등이 나타날 수 있다.
- 7) 소화기계 : 때때로 복통, 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 설사, 소화불량, 변비, 구내염, 구강건조, 설염 등이 나타날 수 있으며 췌장염, 장폐색증이 나타났다는 보고가 있다.
- 8) 간장 : 드물게 황달, 간염 때때로 AST · ALT상승, 간부전 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여중지 등의 적절한 처치를 한다.
- 9) 호흡기계 : 때때로 인두불쾌감, 기침 및 기관지염 드물게 비염, 호흡곤란, 기관지경련 등이 나타날 수 있다.
- 10) 기타 : 때때로 권태감, 피로, 흥분, 흥반, 드물게 열감, 발열, 근육통, 구갈, 미각이상, 이명, 설하 · 입술 · 손가락 마비감, 청색증 등이 나타날 수 있다. 또한 때때로 혈청칼륨의 상승, 드물게 혈청나트륨의 감소가 특히 중증의 신기능장애 환자에서 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 휴약 등의 적절한 처치를 한다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약을 투여전 또는 투여도중에 반드시 신기능을 확인한다.
- 2) 특히 다음 환자에는 초회투여로 일시적으로 급격한 혈압강하가 나타날 수 있으므로 저용량에서 투여를 시작하고 증량하는 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 천천히 한다.
 - ① 중증의 고혈압 환자
 - ② 혈액투석중인 환자
 - ③ 이뇨제를 투여받고 있는 환자(특히 최근에 이뇨제를 투여받기 시작한 환자)
 - ④ 염제한요법 환자
- 3) 수술직전 24시간이내에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 4) 혈압강하작용에 의해 어지러움, 바들거림이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 5) 의사와 상의없이 염대용품을 사용하지 않는다.
- 6) 호중구 감소 및 가능성이 있는 어떠한 전조(예 : 인후통, 발열)도 즉시 보고하도록 환자에게 주의한다.
- 7) 환자에게, 특히 이 약 투여후 처음 수주간 가벼운 두중감이 나타날 경우 보고하도록 주의시키고, 실신이 일어날 경우 의사와 상의할 때까지 투여를 중지한다.
- 8) ACE저해제는 마취제와 진통제의 혈압강하작용을 증가시킬 수 있다. 따라서 혈액량을 증량하거나 필요시 안지오텐신Ⅱ를 투여하는 등 수술전이나 수술도중 적절한 대응조치를 해야한다.
- 9) 아나필락시스 유사반응 : ACE저해제를 투여받고 있는 환자에게 고속투석막으로 혈액투석을 할 경우 아나필락시스 유사반응과 관련된 임상소견이 관찰된 바 있으므로 이들 환자, 특히 아나필락시스 유사반응의 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하고 아크릴로니트릴설폰산나트륨막을 이용한 고속혈액투석중인 환자에는 투여하지 않는다.
- 10) 만성심부전(경증-중등도)의 경우
 - ① 디기탈리스제제, 이뇨제 등 기본 치료제에 충분한 효과가 인정되지 않는 경우에만 추가 투여한다. 단독투여에 대한 유용성은 확립되어 있지 않다.
 - ② 중증의 만성 심부전에 대해서는 유용성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.).

5. 상호작용

- 1) 혈청칼륨을 상승시키는 약물(스피로노락톤, 트리암테렌, 아밀로라이드 등 칼륨보존성 이뇨제, 칼륨보급제, 칼륨함유 염대용품)과 병용투여하는 경우에는 혈청칼륨이 증가될 수 있으므로 주의한다. (특히 신기능장애 환자)
- 2) 리튬과 ACE저해제를 병용투여하는 경우에는 리튬독성의 위험이 있으므로 혈중 리튬농도를 신중히 모니터하고 용량을 조절한다. (리튬의 배설을 감소시켜 혈중리튬농도가 증가한다.)
- 3) 인도메타신 등의 비스테로이드성 소염진통제 및 항류마티스 약물과 병용투여하는 경우에는 이 약의 혈압강하작용이 감소할 수 있으므로 주의한다.
- 4) β -차단제, 메칠도파, 칼슘길항제, 이뇨제 등 다른 혈압강하제와 병용투여하는 경우에는 혈압강하작용이 증가될 수 있다.
- 5) 면역억제제, 세포증식억제제, 알로우리놀, 코르티코이드와 병용투여하는 경우에는 혈구수의 변화가 나타나므로 주의한다.
- 6) 알코올과 병용투여하는 경우에는 알코올 작용이 상승할 수 있으므로 주의한다.
- 7) 정신병치료제와 병용투여하는 경우에는 기립성 저혈압의 위험이 증가될 수 있다.
- 8) 인슐린 또는 경구용 혈당강하제와 병용투여하는 경우에는 혈당강하작용이 증가된다는 보고가 있으므로 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 제2 및 제3기에 ACE저해제를 투여받은 고혈압 환자에서 양수과소증, 태아 · 신생아의 사망, 신생아의 저혈압, 신부전, 고칼륨혈증, 두개형성부전 및 양수과소증에 의한 것으로 추정되는 사지의 경축, 두개단면의 변형 등이 나타났으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다.
- 2) 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서의 과도한 혈압강하는 바람직하지 않으므로(뇌경색등이 나타날 수 있다.) 저용량에서 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.

9. 기타

ACE저해제를 투여받고 있는 환자에게 별도로 탈감작 치료를 하는 경우에는 생명을 위협할 만한 아나필락시스 유사반응이 나타났다는 보고가 있으므로 주의한다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃), 건조 보관

【사용기간】 30개월

※ 본 의약품은 우수 의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국재질자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ☎080-311-2222

※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 개정일자(2004년 10월)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr) 또는 전화 (031)550-0474-8 (주)일화/학술·개발부를 통해 확인할 수 있음

개정년월일 : 2004년 10월