

외용소염 진통제

에스겔 (케토프로펜)

일반의약품

K G M P

적격업체

에스겔은 최근 임상계에서 소염, 진통, 해열, 항류마티스 치료효과에 대해 높은 평가를 받고 있는 케토프로펜(Ketoprofen)을 주성분으로 한 무색 투명한 겔(Gel)타입의 바르는 소염·진통제입니다. 에스겔은 피부에 도포시 흡수성이 뛰어나 신속하고 강력한 항염증 진통작용을 나타내고 부종을 효과적으로 가라앉혀 주며 피부에 도포시 피부 자극감이 없으며 끈적거리지 않고 시원한 느낌을 줍니다.

【성분·함량】 1g 중

케토프로펜(KP)	30mg
파라옥시안식향산메틸(KP)	0.08mg
파라옥시안식향산프로필(KP)	0.02mg

【성상】 무색 투명한 겔(Gel)제

【약리작용】

1. 에스겔은 아픈 부위가 일정치 않은 담이나 신경통에도 환부에 직접 적용할 수 있으며 각종 관절염 치료시에도 치료 효과가 높습니다.
2. 에스겔은 운동이나 육체노동후 근육통, 근육경직, 근육피로를 풀어주고 탈골, 골절, 염좌(삔데)등에 나타나는 염증을 억제하고 통증과 부종을 신속히 가라앉혀 줍니다.
3. 에스겔은 피부병소에 직접 도포, 마사지해 줌으로써 빠르게 흡수되어 신속한 효과를 발휘합니다.
4. 에스겔은 피부 자극감 없이 시원한 느낌을 주며 끈적거리지 않으므로 사용감이 좋습니다.

【효능·효과】

다음 질환 및 증상의 진통·소염 : 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건·건초염, 건주위염, 상완골상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상후의 종창·동통

【용법·용량】

증상에 따라 적당량을 1일 1~4회 환부에 바르고 잘 스며들도록 가볍게 문지른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식 발작을 일으킬 수 있다)
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있다)
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용
 - 1) 드물게 아나필락시스 증상(두드러기, 호흡곤란, 안면부종 등)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
 - 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성수포음, 천명, 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타난다.
 - 3) 피부 : 때때로 발적, 발진, 가려움, 수포·집포, 자극감 및 종창 등의 접촉피부염, 피부건조 및 색소침착이 나타날 수 있다. 또한 적사광선(자외선)에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피진이 전신으로 확대될 수가 있다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지한다.

4. 일반적 주의

- 1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아니라 대증요법에 유의한다.
- 2) 피부강염증을 불현성화 시킬 수 있으므로 감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용하고 충분히 관찰하여 부작용 발현에 유의한다.
- 3) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려한다. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현에 유의한다.
- 4) 1주일 정도 사용하고도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신말기의 랫드에 이 약을 경구투여한 실험에서 태자의 동맥혈관 수축이 보고되었다.
- 2) 임신 후기에 투여(경구, 주사, 직장주입)시 지속성태아순환, 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있다.
- 3) 임부, 산부 및 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 산부 및 수유부에 대하여는 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용을 피한다.

6. 소아에 대한 투여

미숙아, 신생아, 영아, 유아 및 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).

7. 적응상의 주의

- 1) 눈 및 점막에 사용하지 않는다.
- 2) 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 저린감을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의한다.
- 3) 무좀, 백선 등에는 사용하지 않는다.
- 4) 밀봉봉대법을 사용하지 않는다.

[저장방법 및 사용기간]

차광·기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

[포장단위] 50g

- ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.arlico.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.