M36981①

에가푸신® 주

Egafusin® inj.

「전문의약품」
분류번호 : 325

《원료약품의 분량》 이 약 1,000ml 중

아미노초산 (약전)	3,730mg
L－로이신 (약전)	8,180mg
L－메치오닌 (약전)	400mg
L－발린 (약전)	6,300mg
L－세린 (U.S.P.)	1,400mg
L－아르기닌 (U.S.P.)	6,700mg
L－알라닌 (U.S.P.)	2,900mg
L－이소로이신 (약전)	6,500mg
L－트레오닌 (약전)	2,750mg
L－트리프토판 (약전)	440mg
L－페닐알라닌 (약전)	550mg
L－프롤린 (U.S.P.)	3,580mg
L－히스티딘 (U.S.P.)	1,750mg
N－아세틸－L－시스테인 (U.S.P.)	700mg
(L－시스테인으로서	520mg)
초산－L－리신 (U.S.P.)	6,060mg
(L－리신으로서	4,300mg)

《성　　상》

무색 투명한 유리병에 든 무색～미황색의 주사액으로 수액용 고무마개를 한 제제입니다.

《효능·효과》

다음 경우의 비경구 아미노산 보급

- 뇌기능손상(뇌질환)을 수반하거나 수반하지 않는 중증의 간기능 장해(간부전)시
- 간성혼수 치료시

《용법·용량》

보통성인은 총 아미노산으로서 체중 킬로그람당 1일 1.5그람을 최대용량으로 정맥내 점적주사하고 그 투여속도는 60분간에 체중 킬로그람당 1.7-2.1밀리리터(분당 40-50적)로 하십시오.

《사용상의 주의사항》

1. 경고

반드시 의사의 지시에 의해 사용하십시오.

2. 일반적주의

1) 대량 투여시 또는 전해질액을 병용 투여할 경우 전해질 평형에 주의하십시오.
2) 초과량 투여시 대사성 알칼로시스를 일으킬 수 있으므로 초산이온함유 액제는 주의해서 사용하십시오.
3) 신장병, 폐질환, 중증 심장병등 기왕력이 있는 환자에게는 과량의 체액이 치환되는 것을 피하도록 주의해서 투여하십시오.
4) 당뇨병 환자에게 투여할 때에는 혈당치를 자주 측정하십시오.

3. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 중증 신장애환자, 고질소혈증환자
   2) 간장해 이외의 아미노산대사 이상이 있는 환자
   3) 질소이용을 저해하는 대사 장애환자
   4) 소모성 심부전증
   5) 폐수종
   6) 핍뇨증, 무뇨증환자
4. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.
   1) 고도의 아시도시스환자
   2) 울혈성 심부전환자
   3) 신장애가 있는 환자
5. 부작용
   1) 과민증 : 드물게 발진등 과민증상이 나타날 수 있으며, 이런 경우에는 투여를 중지하십시오.
   2) 소화기 : 때때로 구역, 구토등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   3) 순환기 : 때때로 흉부불쾌감, 심계항진, 빈맥, 혈압강하 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   4) 대량급속투여 : 대량 급속투여할 경우 아시도시스가 나타날 수 있습니다.
   5) 기타 : 가끔 오한, 발열, 두통, 호흡곤란, 호흡정지, 쇽, 기관지경축, 요로경축이 나타날 수 있습니다.
   6) 다음의 대사성 합병증이 나타난다는 보고가 있습니다. 대사성 아시도시스, 저인산염혈증, 알칼로시스, 고혈당증, 당뇨병, 삼투적이뇨 및 탈수증, 반동성 저혈당, 간효소 상승, 비타민결핍및 비타민과잉, 전해질 불균형, 소아고암모니아혈증
   7) 신부전 환자는 BUN의 상승을 일으킬 수 있습니다.
6. 임산부 및 유아에 대한 투여
   1) 임산부에 대한 투여
      임산부 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임산부에 대한 아미노산 수액제 투여는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
   2) 유아에 대한 투여
      간미숙의 가능성이 있으므로 투여농도는 2.5% 이하가 바람직합니다.
7. 상호작용
   테트라싸이클린과 병용 투여시 수액 아미노산의 단백절약 효과를 감소시킬 수 있습니다.
8. 적용상의 주의
   1) 천천히 정맥내에 투여하십시오.
   2) 한냉기에는 체온 정도로하여 사용하십시오.
   3) 이 약의 투여중 폐혈증의 위험이 항상 존재하므로 수액제제 조제와 관리는 철저히 무균상태에서 행하고, 주사기구의 멸균에 특별히 주의하십시오.
   4) 잔여의 액 및 완전히 징명하지 않은 것은 사용하지 말 것이며, 다른 용액을 혼합후 신속하게 사용하여야 하고 냉장고 저장은 24시간이내로 하십시오.

《포장단위》 250ml, 500ml

《저장방법·사용기간》 밀봉용기, 실온보관 : 3년

Ⓡ = 등록상표

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상에서 교환하여 드립니다.

(문의처 : 본사학술부 (02) 463-8131~9)

소비자상담실 : (02) 2041-8349
홈페이지 www.yungjin.co.kr

102387
121593

제조발매원
영진약품공업주식회사
공장 : 경기도 화성시 무송동 470-5