멘탁스®크림

(염산 부테나핀)

「일반의약품」
분류번호:265

멘탁스 크림은 日本 科研 제약에서 합성한 새로운 구조의 Benzylamine계 항진균제 입니다. 멘탁스 크림은 백선균을 비롯한 표재성진균에 대해 우수한 항진균 작용을 나타냅니다. 또한, 효력의 지속시간이 길어 1일 1회 도포로 백선 및 전풍에 우수한 임상효과를 발휘합니다.

[원료약품의 분량] 이 약1g 중

염산부테나핀(별규) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10mg

안식향산나트륨(약전) · · · · · · · · · · · · · · · · · 2mg

[성상]

백색의 크림으로 약간 특이한 냄새가 있습니다.

[작용 및 특성]

1. 멘탁스는 기존의 제제와는 구조가 다른 새로운 구조의 Benzylamine계 항진균제 입니다.
2. 멘탁스의 작용기전은 세포막의 구성 성분인 Ergosterol의 합성을 저해하며, 작용부위는 Imidazole계 약제와 다릅니다.
3. 멘탁스는 백선균을 비롯한 표재성 진균에 대해 우수한 살균 작용을 나타납니다.
4. 멘탁스는 표피를 통해 흡수될 뿐만 아니라, 모낭(毛囊) 흡수에 의해 신속히 각질층 및 피부심부(深部)로 침투합니다.
5. 멘탁스는 신속한 임상효과를 발휘하여, 특히 난치성의 족부백선에 유용성을 나타냅니다.
6. 멘탁스는 1일 1회 도포로 치료효과를 나타내므로, 환자의 Compliance를 향상 시킵니다.

[효능 · 효과]

다음의 피부진균증에 사용합니다

1. 백선: 족부백선, 고부백선(완선), 체부백선
2. 어루러기

[용법 · 용량]

1일 1회 환부에 바르십시오.

치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자.
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   (1) 알릴아민계 항진균제에 민감한 환자.(교차반응이 나타날 수 있습니다.)
   (2) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
3. 부작용

피부: 때때로 국소자극감, 발적, 홍반, 가려움, 접촉피부염, 수포, 드물게 미란(짓무름), 인설, 균열(갈라짐)이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적주의

(1) 이 약 사용으로 인해 자극 또는 민감성이 나타나면 치료를 중지하고 적절한 요법을 실시하십시오.

(2) 수산화칼륨용액으로 직접적인 현미경적 검사 또는 적당한 배지에 배양함으로써 질병의 진단을 확인할 수 있습니다.

(3) 의사의 지시가 없는 한 밀봉붕대법 또는 포장법을 사용하지 마십시오.

(4) 적응증 이외의 질환에 이 약을 투여하지 마십시오.

(5) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행하십시오.

(6) 이 약은 안식향산 나트륨을 포함하고 있으며, 안식향산은 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있습니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

(1) 임신 중의 사용에 대한 안정성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여 하십시오.

(2) 이 약의 모유로의 이행 여부에 대해 알려진 바 없으나 많은 약물들이 모유로 이행하므로 수유부에 이 약 투여시 주의하십시오.

6. 소아에 대한 투여

미숙아, 신생아 및 12세 이하의 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않습니다.

7. 적용상의 주의

(1) 이 약은 외용으로만 적용하십시오.

(2) 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용하십시오.

(3) 심한 미란(짓무름) 부위에는 사용하지 마십시오.

(4) 족부백선, 체부백선, 완선 환자의 환부 및 그 주위의 피부를 덮을 수 있도록 이약을 충분히 적용하십시오.

(5) 이 약을 적용하기 전에 환부를 깨끗이 씻고 완전히 건조시킨 후에 적용하며 적용후에는 손을 씻으십시오.

8. 적용상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

[포장단위] 5g, 10g, 20g, 100g
[저장방법] 차광, 기밀용기, 실온보관
[사용기간] 32개월

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.

소비자 상담실(02)3408-8349

110800
122801

제조발매원
영진약품공업주식회사
본사 : 서울 · 성동구 성수동2가 3동 277-58
공장 : 경기도 화성시 무송동 470-5

원료공급원
KAKEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
Tokyo, Japan