항진균, 항트리코모나스제

카마졸 질정

(클로트리마졸)

Camazol vaginal Tab.

일반의약품	
분류번호	255

카마졸은 피부 사상균류 효모균류 및 그외의 진균류에 효과가 있으며 또한 트리코모나스와 그람양성세균(연쇄상 구균류/포도상 구균류) 및 그람음성 세균류(박테로이드/질의 헤모필루스균)에도 좋은 효과가 있습니다.

조성 · 성상

1. 조성 : 1정 중
   클로트리마졸(약전) ····· 100mg
2. 성상
   한쪽끝이 볼록한 백색의 막대형 질정

효능 · 효과

칸디다성 질염, 트리코모나스성 질염

용법 · 용량

성인 : 보통 1일 1회 클로트리마졸로서 100mg을 연속 6일간 취침시에 질내 깊숙이 삽입한다. 단기요법으로 보통 성인 1일 1회 클로트리마졸로서 200mg을 연속 3일간 취침시 질내 깊숙이 삽입한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   이 약에 과민증 환자
2. 부작용
   때때로 국소 작열감, 자극감, 동통, 구진, 하복부경련, 부종, 두드러기, 홍반, 가려움, 발적, 가벼운 빈뇨 등의 증상이 나타날 수 있다.
3. 일반적 주의
   1) 생리기간 중에는 되도록 사용하지 않는다.
   2) 트리코모나스질염의 완벽한 박멸을 위해서는 구강 트리코모나지듐의 치료가 요구된다.
   3) 외음부염이나 칸디다성 귀두염이 수반된 경우 추가적으로 클로트리마졸크림 제제를 사용하는 것이 바람직하다.

4) 재감염을 막기 위해서는 개인이 사용하는 수건이나 내의 등을 매일 바꾸어 입고 입었던 것은 삶아서 세탁하는 것이 바람직하다.

5) 치료후에도 증상이 계속되면 다른 항진균 요법을 사용하기 전에 다른 병원균을 제거해야 한다.

4. 상호작용

이 약은 콘돔, 질내 피임용격막과 같은 라텍스 또는 고무제품을 약화시킬 수 있으므로 주의한다.

5. 임부에 대한 투여

임신 1기에는 약물의 치료효과가 위험성을 상회하는 경우에 한해 신중히 투여한다. 임신 1기에 자발적 유산위험이 높아질 가능성이 있기 때문이다.

임신 2, 3기에는 위의 위험성이 관찰되지 않는다.

임신기간 중 사용시에는 삽입기구의 사용은 피한다.

6. 수유부에 대한 투여

수유부에는 사용하지 않는다.

7. 과량투여시의 처치

동물실험에서 고용량의 경구투여시 태아독성이 나타났다는 보고가 있다. 실수로 경구복용한 경우 가능한 빨리 위세척 등의 처치를 한다.

8. 적용상의 주의

이 약은 질에만 사용하고 내복용으로는 사용하지 않는다.

포장단위

자사 포장단위

저장방법 및 사용기간

기밀용기, 실온(1~30℃)보관　　사용기간 : 제조일로부터 36개월(3년)

취급상의 주의사항

본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(K. G. M. P)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 담당영업사원이나 출장소에 연락해 주시면 약국 등의 개설자에 한하여 교환해 드립니다.

홍익 · 정도 경영

KUNWHA 근화제약주식회사

공　　장 : 충남 공주시 정안면 사현리 298-2

본　　사 : 서울특별시 송파구 가락동 94

대표전화 : 02) 431-3100

R84-07-07
02-09-05