The Best Choice of Phosphate Binder

네프로 정

(초산칼슘)

Nephro Tab.

(Calcium acetate)

일반의약품	
분류번호	219

특 장

네프로정은 기존 칼슘제제와 비교시 인산결합력이 3배정도 강력합니다.
네프로정은 기존 칼슘제제와 비교시 산, 알칼리에 관계없이 약 100, 000배정도 용해되어 체내 이용율이 우수합니다.
네프로정은 고칼슘혈증과 같은 부작용 발현율이 현저히 낮습니다.

조성 · 성상

1. 조성 : 1정중
   초산칼슘(유.에스.피) ····· 710.0밀리그람
   (무수물로서 667밀리그람)
2. 성상 : 반할선이 있는 백색의 원형 정제

효능 · 효과

말기 신부전 환자의 고인산혈증

용법 · 용량

1. 초기용량 : 매 식사 중 2정씩 경구복용한다.
2. 유지용량 : 고칼슘혈증을 유발하지 않는 상태에서 혈중인산의 농도가 6mg/d 이하가 될때까지 용량을 점차 증가시킨다. 통상 식사 중 3-4정을 경구복용한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   고칼슘혈증
2. 부작용
   고칼슘혈증을 유발할 수 있으며 경증의 고칼슘혈증(Ca)10.5mg/d)은 무증상이거나 변비, 식욕부진, 오심, 구토를 일으킬 수 있으며 중증은 착란, 지각탈실, 혼수 등을 일으킬 수 있다. 경증일 경우는 복용량을 줄이거나 복용을 중지하고 중증일 경우에는 복용을 중지하고 혈액투석을 실시한다.
3. 일반적 주의
   1) 이약의 복용량은 초기에 결정하여 필요에 따라 조정한다.
   2) 이 약의 과량투여는 고칼슘혈증을 유발할 수 있으므로 용량을 결정하는 치료초기 단계에 혈중 칼슘농도를 1주일에 2번씩 측정한다.
   3) 고칼슘혈증은 심부정맥을 촉진할 수 있기 때문에 디기탈리스를 투여하는 환자에게는 이 약을 투여하지 않는다.
   4) 혈중 인산농도는 정기적으로 측정해야 한다.
   5) 비처방된 제산제와의 복용은 피한다.
   6) 인산과 결합한 혈중 칼슘은 66을 넘지 않아야 한다.
4. 상호작용
   이 약은 테트라싸이클린의 생물학적 활성을 낮출 수 있다.
5. 임부 및 소아에 대한 투여
   1) 이 약을 투여하여 실시한 동물실험에서는 최기형성이 나타나지 않았으나 임부에게 투여할 경우에는 유익성이 위험성을 상회할 경우에만 투여한다.
   2) 소아에 대한 안전성과 유효성은 확립되어 있지 않다.
6. 기타
   고칼슘혈증의 증상을 환자에게 인지시켜 주의하도록 한다.

포장단위

자사 포장단위

저장방법 및 사용기간

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 사용기간 : 제조일로부터 24개월(2년)

취급상의 주의사항

본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(K.G.M.P)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 담당 영업사원이나 출장소에 연락해 주시면 약국등의 개설자에 한하여 교환해 드립니다.

홍익 · 정도 경영

KUN WHA 근화제약주식회사

공 장 : 충남 공주시 정안면 사현리 298-2
본 사 : 서울특별시 송파구 가락동 94
대표전화 : 02) 431-3100

R 98-11-30