

※사용전에 첨부문서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품

분류번호:255

KGMP제품

항진균제

래피탈[®]
(클로트리마졸)

질정

500mg

Rapital Vaginal Tablets

래피탈 질정 500mg은 광범위 항진균제인 Clotrimazole을 주성분으로 하고 있습니다.

래피탈 질정 500mg은 Candida sp.(칸디다속), Trichophyton sp.(백선균속), Microsporum sp.(소포자균속), Malassezia furfur(Pityrosporum orbiculare, 효모균), Trichomonas sp.(트리코모나스속), Gram positive bacteria, Aspergillus속 및 기타 피부사상균으로 인한 감염증에 1회 투여로 우수한 효과를 나타냅니다. 또한 다른 항진균제에 내성을 타내었던 진균감염증에도 좋은 효과를 나타냅니다.

■ 원료약품의 분량 1정중

클로트리마졸(유. 에스. 피)500.0mg

■ 성 상 백색의 타원형 질정

■ 효능 · 효과 칸디다성 질염, 트리코모나스성 질염

(상기 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.)

■ 용법 · 용량

성인 : 보통 1일 1회 클로트리마졸로서 500mg을 1일간 취침시 질내 깊숙이 삽입합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약에 과민증이 있는 환자

2. 부작용 : 때때로 국소의 작열감, 자극감, 동통, 구진, 하복부 경련, 부종, 두드러기, 홍반, 가려움, 발적, 빈뇨 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

3. 일반적 주의

1) 생리기간중에는 되도록 사용하지 마십시오.

2) 트리코모나스질염의 완벽한 박멸을 위해서는 구강 트리코모나지움의 치료가 요구됩니다.

3) 외음부염이나 칸디다성 귀두염이 수반된 경우 추가적으로 클로트리마졸크림제제를 사용하는 것이 바람직합니다.

4) 재감염을 막기 위해서는 개인이 사용하는 수건이나 내의 등을 매일 바꾸어 입고 입었던 것은 삶아서 세탁하는 것이 바람직합니다.

5) 치료후에도 증상이 계속되면 다른 항진균 요법을 사용하기 전에 다른 병원균을 제거해야 합니다.

4. 상호작용

이 약은 콘돔, 질내 피임용격막과 같은 라텍스 또는 고무제품을 약화시킬 수 있으므로 주의해야 합니다.

5. 임부에 대한 투여

임신 1기에는 약물의 치료효과가 위험성을 상회하는 경우에 한해 신중히 투여해야 합니다. 임신 1기에 자발적 유산위험이 높아질 가능성이 있기 때문입니다. 임신 2, 3기에는 위험성이 관찰되지 않습니다. 임신기간 중 사용시에는 삽입기구의 사용은 피하십시오.

6. 수유부에 대한 투여

수유부에는 사용하지 않습니다.

7. 과량투여시의 처치

동물실험에서 고용량의 경구투여시 태아독성이 나타났다는 보고가 있습니다. 실수로 경구복용한 경우 가능한 빨리 위세척 등의 처치를 하십시오.

8. 적용상의 주의

이 약은 질에만 사용하고 내복용으로 사용하지 마십시오.

■ 저장방법 및 사용기간 밀폐용기, 3년

■ 포장 단위 1, 2정

※본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※이 첨부문서 작성일자 (2004년 5월) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실(02-335-6860)에서 확인할 수 있습니다.

® 등록상표

제품설명서 작성년월일 : 1996년 6월

제품설명서 개정년월일 : 2004년 5월

제조발매원
정계제약주식회사
경기도 용인시 구성읍 마북리 382-3
제품문의 : 학술부 TEL:02)335-6860
홈페이지 : www.chunggei.co.kr