

잇몸질환 전문치료제

덴포스 에프 캡슐

DENFORCE-F Caps.

일반의약품
분류번호:231

잇몸질환에는 치조농루(치주염)와 치은염이 있습니다. 이러한 잇몸질환은 여러가지 원인에 의해 치아를 고정·유지·보호시켜주는 치아 주위조직(잇몸, 치근막, 치조골 등)에 염증이 발생하여 칫솔질을 할 때 가끔 출혈이 나타나거나 잇몸이 발적되고 입냄새 등의 증상이 나타나는 치은염으로 시작되어 부기, 출혈, 고름으로 이어져 나중에는 치아의 뿌리(치근)인 하부조직까지 염증상태가 확산되며 증상이 더욱 심하게 되면 치아가 흔들리고 빠져버리기도 하는 치주염을 일으킵니다. 이와같은 잇몸 질환은 잇몸에 대한 직접적인 자극(치석, 치태 등)이나 구강내 세균 및 전신적인 원인(비타민의 부족, 내분비 이상, 대사 이상등)에 의해 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 덴포스에프 캡슐은 잇몸의 증상을 정상화시키는 비타민 2종과 염증을 억제하는 염화 리소짐 및 혈관을 강화하고 지혈작용을 하는 카르바조크롬을 적절히 배합한 잇몸질환 치료제입니다.

【성상】
엷은 주황색 가루가 든 상·하부 담청색의 경질캡슐제

【성분·함량】 1캡슐중

염화리소짐 (식약청고시)	30.0mg(역가)
제피아스코르빈산(식약청고시)	156.3mg
(아스코르빈산으로서 150.0mg)	
초산토코페롤 50%(식약청고시)	10.0mg
(초산토코페롤으로서 5.0 I.U.)	
카르바조크롬(식약청고시)	2.0mg

【효능·효과】
치은염, 치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 고름 등)의 완화
(상기 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 있을 수 있습니다.)

【용법·용량】
성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오
 - 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 다른 약물을 투여받고 있는 환자
 - 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 부작용
 - 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
 - 피부:스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진, 발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오
 - 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오
 - 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오

【포장단위】120, 240캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온보관, 3년

※ 기타 자세한 사항은 약사 또는 의사에게 문의하십시오. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 경우 구입하신 약국을 통하여 교환 하시기 바랍니다.

제조발매원
정제제약주식회사
경기도 용인시 구성읍 마북리 382-3
제품문의 : 학술부 TEL : 02)335-6860
홈페이지 : www.chunggei.co.kr

제품설명서작성년월일 : 1999년 11월
제품설명서개정년월일 : 2003년 11월