점액 용해성 거담제

소담 캡슐200mg

(아세틸시스테인)

일반의약품

Acetylcysteine

Sodam Cap.

분류번호:222

■**원료약품의분량** (1캡슐 중)

아세틸시스테인(U.S.P.) - 200mg

■**성 상 :** 백색의 결정성 분말이 든 상·하부 주황색의 경질 캡슐제

■**효능·효과**

1. 다음 질환에서의 객담배출곤란

급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성섬유증

2. 인후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성 중이염

■**용법·용량**

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다.

1. 급성환자

성인 : 1회 200mg 1일 3회

소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회, 2~5세 1회 100mg 1일 3회

2. 만성질환

성인 : 1회 200mg 1일 2회

소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회

3. 낭성섬유증

소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2~5세 1회 100mg 1일 4회

연령, 증상에 따라 적절히 증감 한다.

■**사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1)이 약에 과민증 환자

2)위·십이지장궤양 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

신생아(중증질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)

3. 부작용

1)소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.

2)과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식환자)등이 나타날 수 있다.

3)드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다.

4. 상호작용

경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용 투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다. (적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다.)

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.

6. 수유부에 대한 투여

이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

7. 적용상의 주의

이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

■**포장단위** : 10, 100, 300, 500, 1000캡슐

■**저장방법 및 사용기간 :** 기밀용기, 실온보관(1~30℃). 제조일로 부터 24개월

만약 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드리겠습니다.

개정 : SD-2004-08-19

* 이 첨부문서 작성일자(2004년 08월 19일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.scd.co.kr)의 '제품안전성정보'에서 확인하실 수 있습니다.

제조 및 판매원

삼천당제약주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 904-1

대표전화 : (02)2679-0146, http://www.scd.co.kr