


Non-Sedating Antihistamine

노타민 정

NOTAMIN Tab. (Loratadine 10mg)

500정



인국약품(주)

본사: 서울특별시 영등포구 대림동 993-75
공장: 경기도 화성시 향남면 상신리 903-2

■성분·함량: 1정 중

로라타딘(별규) 10mg

■성상: 백색의 타원형정제

■효능·효과: 알레르기성 비염(재채기, 코막힘, 가려움, 눈의 작열감),
만성 특발성 두드러기

■용법·용량:

성인 및 12세 이상의 소아: 로라타딘으로서 1일 1회 10mg을 경구투여한다.

6-12세 미만의 소아: - 체중 30kg이상: 이 약으로서 1일 1회 10mg 투여한다.

- 체중 30kg이하: 이 약으로서 1일 1회 5mg투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말것: 1) 이 약에 과민증 환자 2) 6세미만의 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것: 간장애 또는 신부전 환자

3. 부작용: 이 약과 위약과의 비교 임상시험에서 진정작용, 항콜린작용이 관찰
되었고 피로, 구역, 두통, 빈맥, 실신, 구갈, 위장장애, 식욕증진 등이 보고되었
다. 그 밖에 탈모증, 아나필락시스, 간기능장애, 상실성 부정빈맥 등이 나타난다.

4. 일반적 주의: 만일 피부자극 시험을 할 경우에는 항히스타민제제들이 피부
반응 표시기에 양성반응을 방해 및 감소시킬 수 있으므로 피부시험 실시
약 4일전에는 투여하지 않는다.

5. 상호 작용: 이 약과 시메티딘, 에리스로마이신, 케토코나졸, 퀴니딘, 플루코

나졸, 플루옥세틴과 병용투여시 이 약의 대사가 저해되어 혈중농도가 높아진다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부에 대한 안전성은 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성
이 있는 부인에는 투여하지 않는다.

2) 이 약이 모유중으로 이행되므로 수유중에는 투여하지 않는다.

7. 과량투여시의 처치: 과량을 투여했을 때에는 즉시 대중요법과 지지요법을
시작하여야 한다. 환자가 자발적으로 구토를 일으키지 않더라도 구토를 유발
시켜야한다. (토근을 이용하는 방법이 우선적으로 사용된다.) 그러나 의식장애
가 있는 환자에게 구토를 유도하여서는 안된다. 구토 후에 활성탄과 물을 회식
하여 투여할 수도 있다. 만일 구토가 성공적이지 못하거나 금기 사항일 경우
는 위세척을 실시하여야 한다. 이 약은 투석으로는 제거되지 않는다. 응급처치
이후 환자는 지속적으로 관찰되어야 한다.

■저장방법: 밀폐용기, 실온보관

■제조번호:

■사용기한:



▶ 본 제품은 재정경제부가 고시한 소비자피해보상규정에 의거 정당한
소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

• 소비자 상담실 Tel.(02)3289-4253~7 • 수신자 부담 Tel.(080-001-4125