

기미 · 주근깨 · 여드름

KGMP

우수의약품제조업체

일반의약품

분류번호 325

셀 라 인 연질캡셀

(엘-시스틴)

500mg

우리 생체내(生體內)에 가장 중요한 구성성분인 경단백질(硬蛋白質)인 L-Cystine은 함황(含黃) Amino산이며 이 Amino산은 우리 인체에서 머리카락에 4%, 피부에 0.6%, 손톱에 6% 함유되어 있으며 녹용(鹿茸)중에는 무려 20%나 함유되어 있습니다.

미국 소아과 학회에서 모유(母乳)와 우유(牛乳)로 성장한 아이들의 건강 상태를 비교 검토한 결과 우유로 성장한 아이들이 질병에 약하고 피부가 거칠고 세균감염에 잘 걸린다는 보고가 있었습니다.

이러한 보고를 토대로 W.H.O.에서 밝혀진 결과 우유속에는 L-Cystine이 없고 모유속에 다량 함유 되었다는 사실이 보고 되었습니다. L-Cystine이 생체내에 부족하게 되면 기미, 주근깨, 여드름 등이 잘 생기며 피부의 윤택과 탄력이 없어지고, 알러지 반응을 잘 일으켜 두드러기, 습진, 알러지성 비염, 천식화분병(花粉病), 피부염이 발생하게 됩니다.

또한 Keratin(硬蛋白質의 일종으로 毛, 角, 蹄, 爪 등에 함유되어 있고 약품이나 효소에 대하여 저항력이 대단히 강하다) 생성계(生成系)에 중요한 위치를 차지하는-SH 효소작용 저하로 간장(肝臟)의 해독작용이 약화되며 백혈구(白血球)의 작용 저하로 세균 감염성 질환에 쉽게 감염됩니다. 또 Insulin의 생성부족으로 당뇨병을 일으키고 탈모형상(脫毛形象)이 나타납니다.

▣ 원료약품 및 그 분량 : 1캡셀 중

엘-시스틴(비피)..... 500mg
파라옥시안식향산메칠(약전) 0.28mg
파라옥시안식향산프로필(약전) 0.07mg

▣ 성 상

유백색 유상물질이 든 황적색의 연질캡셀



제조 · 판매원 www.boramph.co.kr

보람제약주식회사

경기도 안산시 목내동 471

□ 효능 · 효과

1. 전신권태
2. 약물에 의한 피부염
3. 기미, 주근깨, 햇빛에 탄데 등의 색소침착증
4. 습진, 두드러기, 피부발진, 여드름
5. 손톱 발톱이나 머리카락이 쉽게 갈라지는 등의 각질부의 질환의 치료 및 예방

□ 용법 · 용량

하루에 2~4캡셀을 2~3개월간 계속 복용하거나 한달중 10~20일간 복용하십시오.

□ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
중증 신기능 장애 및 간성혼수
2. 시스틴 뇨증인 경우는 신중히 투여하십시오.
3. 복용시 다음 사항에 주의하십시오.
 - 1) 때때로 구역, 드물게 설사, 구갈, 가벼운 복통 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 시스틴 뇨증인 경우는 신중히 투여하십시오.
 - 3) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
(6세 이하의 소아에는 투여하지 마십시오.)
4. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항에 주의하십시오.
1개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5. 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오용을 피하고 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

□ 저장방법

기밀용기

- ◆ 본 의약품은 우수약품제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.