

파킨슨증후군치료제

**명인 벤즈트로핀 메실레이트** 1mg  
레이트 정 2mg

**Benztropine mesylate Tab.(U.S.P.)**

분류번호 : 119

명인 벤즈트로핀 메실레이트정은 부교감신경차단제인 atropine과 항히스타민제인 diphenhydramine의 약리학적 활성부분을 결합시킨 합성 화합물입니다.

본제는 항콜린 및 항히스타민작용을 동시에 발현하여 대뇌선조체에서 acetylcholine의 활성을 억제하므로써 acetylcholine과 dopamine의 농도 균형을 회복시켜 파킨슨증후군을 치료해 줄 뿐만 아니라 항정신병약 투여로 인한 파킨슨증에도 효과적인 제제입니다.

**【원료약품 및 그 분량】**

메실산벤즈트로핀 (Benztropine mesylate)(U.S.P) ..... 1mg, 2mg

**【성상】**

1mg 및 2mg 공히 백색의 원형정제

**【효능·효과】**

1. 특발성 파킨슨증
2. 기타의 파킨슨증(뇌염후, 동맥경화성)
3. 항정신병약 투여로 인한 파킨슨증

**【용법·용량】**

성인 : 초기량은 메실산벤즈트로핀으로서 1일 0.5~1mg을 경구투여합니다. 그 후 5~6일 간격으로 1일 0.5mg씩 점차 증량하여 유지량으로 합니다. 이 때 유지량은 증상의 개선과 부작용 발현 등을 고려하여 결정하며 1일 6mg을 초과하지 않습니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 녹내장 환자
- 2) 이 약에 과민증 환자
- 3) 중증 근무력증 환자
- 4) 3세 미만의 유아

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 전립선 비대 등 요로 폐쇄성 질환 환자
- 2) 부정맥 또는 빈맥 환자
- 3) 간·신장에 환자
- 4) 고령자
- 5) 3세 이상의 유·소아
- 6) 고온 환경에 있는 자(발한 억제에 나타날 수 있는 환자)

3. 부작용

- 1) 정신신경계 : 운동실조 또는 정신착란, 환각, 의식장애, 헛소리, 신경과민, 흥분, 불안, 우울증, 권태감, 수족의 지각이상 등이 나타날 수 있습니다.

- 2) 소화기계 : 구갈, 구역, 구토, 변비 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
  - 3) 비뇨기계 : 때때로 배뇨곤란, 요폐 등이 나타날 수 있습니다.
  - 4) 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
  - 5) 눈 : 조절장애 등이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
- 1) 이 약을 투여할 때 소량부터 시작해서 충분히 관찰하여 신중히 유지량까지 증량합니다. 또 다른 약에서 이 약으로 바꿀 때는 다른 약을 천천히 감량하고 이 약을 점차로 증량합니다.
  - 2) 이 약 투여중에는 정기적인 우각검사와 함께 안압검사를 하는 것이 바람직합니다.
  - 3) 일반적으로 항파킨슨제는 페노치아진계 약물·유도체로 인한 입주위 등의 불수의운동(지발성 운동장애)을 경감시키지 않습니다. 경우에 따라 이러한 증상을 악화시킬 수 있습니다.
  - 4) 조절장애와 더불어 주의력, 집중력, 반사기능 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.
5. 상호작용
- 1) 페노치아진계 약물, 삼환계 항우울약, MAO저해제, 레세르핀 유도체와 병용시 이 약의 작용이 증강될 수 있으므로 신중히 투여합니다.
  - 2) 항콜린성 약물(페노치아진계 약물, 삼환계 항우울약 등)과 병용시 장관마비(식욕부진, 구역·구토, 심한 변비, 복부팽만 또는 이완 및 장내용물 울체 등의 증상)가 나타나 마비성 장폐색으로 이행될 수 있으므로 장관마비가 나타나는 경우에는 투여를 중지합니다. 또한 이러한 구역, 구토는 진토작용에 의하여 은폐될 수 있으므로 주의합니다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 임부 및 수유부의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

#### **[저장방법]**

차광한 기밀용기

#### **[포장단위]**

1mg정 : 2000정

2mg정 : 1000정

#### **[제품문의처]**

소비자 상담실 : 080-587-7575(수신자 요금부담)

※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

설명서 개정년월 : 2006. 01.

<http://www.myunginph.co.kr>

BZT 0106-08