KGMP 적격업체 제품 | 본 제품은 우수의약품 제조관리기준에 적합하게 제조 되었습니다.

소화효소제

판가® 정 캅셀

(판크레리파제)

Pancrelipase Tab., Cap.(U.S.P.)

Panga Tab., Cap.

【일반의약품】 분류번호 : 233

췌장기능이 감퇴되어 소화불량을 일으키게 되면, 섭취한 음식물의 각종 영양소를 골고루 흡수하지 못하게되어 결국 인체의 조화를 깨뜨리고 건강을 잃기가 쉽습니다.

판가®는 순도와 역가가 높은 소화효소제이기 때문에 감퇴된 소화력을 정상으로 회복시키고, 섭취된 음식물을 신속하게 분해하여 갖가지 영양소를 흡수시킴으로써 건강하게 일상생활을 영위할 수 있게 해줍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 또는 1캅셀중

판크레리파제(Pancrelipase)(U.S.P.) ·····325mg

아밀라제 : 30,000 USP units

프로테아제 : 30,000 USP units

리파제 : 8,000 USP units

- 성상－정제 : 엷은 황록색의 장방형 당의정(황색 4호〈타르트라진〉 함유)

  캅셀 : 엷은 황갈색의 분말이 든 상부 녹색, 하부 연두색의 경질캅셀제

【약리작용 및 특징】

1. 판가®는 Protease, Amylase 및 Lipase의 활성이 강력하기 때문에, 섭취한 음식물중의 단백질, 탄수화물 또는 지방질 성분을 신속하고도 골고루 분해하여 인체에 필요한 영양분이 쉽게 흡수될 수 있도록 해줍니다.
2. 판가®는 미국약전(U.S.P.) 처방의 역가가 높은 소화효소제로서, 위장의 산도(酸度)를 조정하여 소화 효소의 활성이 최대로 나타나도록 제제화(製劑化) 되어 있습니다.
3. 판가®는 소화효소제로 독성이 비교적 적으며, 췌장기능감퇴에 기인된 소화력을 증진시켜 줍니다.

【효능 · 효과】

다음 질환에 사용할 수 있습니다.

외분비췌장효소장애(소화불량, 위부팽만감), 만성췌장염, 낭성섬유증, 위장관수술후 · 췌장절제술후 소화장애, 췌장암으로 인한 췌담관폐쇄

【용법 · 용량】

- 성인 : 판크레리파제로서 1회 325～650mg을 1일 3회 식후에 경구 투여합니다.
- 소아 : 1회 11～14세 325～650mg, 8～10세 325mg을 1일 3회 투여합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 돼지고기에 과민증의 병력이 있는 환자.
   2) 급성 췌장염 환자, 만성 췌장염의 급성 발현 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
   2) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.(정제에 한함)
3. 부작용
   1) 과민증 : 과민증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
   2) 소화기계 : 때때로 위장관에 대한 부작용이 보고되어 있습니다. 또한 고용량 투여시 구역 또는 설사가 나타날 수 있습니다.
   3) 기타 : 외인성 췌장효소의 대량투여는 고뇨산뇨증과 고뇨산혈증에 관련되어 있습니다.
4. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
   2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 투여하십시오.
   3) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
5. 임부에 대한 투여
   이 약의 태아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
6. 소아에 대한 투여
   1) 이 약은 7세미만의 영 · 유아에게 경구투여하지 않습니다.
   2) 낭포성 섬유종을 앓고 있는 3~13세 소아에 고용량의 판크레아틴을 투여했을 때, 대장의 섬유 협착증이 발생한 예가 있으므로 낭포성 섬유종 환자에게 이 약을 고용량 투여해선 안되고, 이 약을 투여받는 모든 환자는 주의깊게 관찰해야 한다.
7. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법 및 사용기간】
기밀용기, 실온보관, 3년

【포장단위】
정제 : 30, 100, 500, 1000정
캅셀 : 30, 100, 250, 500캅셀

※ 유통과정중 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병 · 의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

http://www.myunginph.co.kr
PG 0501-08

제조판매원
명인제약주식회사
경기도 화성시 팔탄면 노하리 186-1