

잇몸의 발적·부기·출혈에

이가탄

캡슐

분류번호 : 231(치과구강용약)

이가탄캡슐은 염화리소짐, 카르바조크롬, 호박산토코페롤칼슘(비타민 E), 제피아스코르빈산(비타민 C)을 함유하고 있어서 잇몸의 발적·부기·출혈·고름과 같은 치은염·치조농루에 의한 여러 증상을 완화시키는 작용을 나타냅니다.

【유효약품 및 그 분량】 1캡슐중

염화리소짐(식품의약품안전청고시)	15mg(역가)
카르바조크롬(식품의약품안전청고시)	1mg
호박산토코페롤칼슘(약전)	17mg
제피아스코르빈산(별첨규격)	78mg
(아스코르빈산으로서 75mg)	

【성상】 옅은 주황색 가루가 든 상·하부 노란색의 경질 캡슐제

【약리작용 및 특징】

1. 잇몸질환에 대한 소염작용 및 지혈작용

이가탄캡슐은 잇몸질환에 대해 소염작용을 나타냄으로써 발적·부기 등의 잇몸질환 증상을 개선하며, 트롬빈(thrombin)의 작용을 부활시켜 지혈작용을 발현함으로써 잇몸출혈을 완화시킵니다.

2. 잇몸조직의 손상방지

이가탄캡슐 중의 호박산토코페롤칼슘(비타민 E) 및 제피아스코르빈산(비타민 C)은 항산화작용이 있어 잇몸의 손상을 방지합니다.

3. 효과적인 잇몸질환치료제

이가탄캡슐은 잇몸질환의 예방·치료에 있어 서로 상승효과를 나타내는 4가지 성분의 복합처방제제로 치조농루, 치은염 등 잇몸질환의 재증상 완화에 효과적입니다.

잇몸질환의 증상이 호전되었다 할지라도 복용을 중단하지 마시고 잇몸 영양제인 호박산토코페롤칼슘 및 제피아스코르빈산이 함유되어 있으므로 잇몸조직의 건강을 위해 꾸준히 복용하시는 것이 효과적입니다.

【효능·효과】

치은염·치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적·부기·출혈·고름 등)의 완화

【용법·용량】

- 성인 : 1회 2캡슐을 1일 3회 식후 복용하십시오.
- 소아(8~14세) : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

2. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의합니다.
- 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막만증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적·화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의합니다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받습니다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여합니다.
- 3) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의합니다.
- 4) 이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않습니다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고, 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관합니다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

【포장단위】 30, 60, 120캡슐

【제품문의처】 소비자 상담실 : 080-587-7575
(수신자 요금부담)

- ※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

설명서 개정년월 : 2006. 09

http://www.myunginph.co.kr

ITC0906-18



제조판매업

명인지약주식회사

경기도 화성시 달안동 노하리 106-1

※ 본 의약품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 본 의약품과 함께 보관하십시오.

Parodontopathy Remedy

IGATAN

Cap.

【COMPOSITION】 Each capsule contains,

Lysozyme chloride	15 mg (activity)
Carbazochrome	1 mg
Tocopherol calcium succinate	17 mg
Coated ascorbic acid	78 mg
(equivalent to ascorbic acid 75 mg)	

【APPEARANCE】

Yellow hard capsules filled with light orange powder.

【INDICATIONS FOR USE】

Relief of symptoms (Gingival redness, swelling, hemorrhage and blennorrhagia) caused by parodontitis and dentoalveolitis

【DOSAGE AND ADMINISTRATION】

- Adults: 2 capsules, three times daily, after meals.
- Children (8 ~ 14 years of age) : 1 capsule, three times daily, after meals.

【CAUTIONS FOR USE】

1. Precautions

- 1) Patients who have a history of allergic reactions (fever, rash, arthralgia, asthma, pruritus, etc.) to drugs or eggs.
- 2) Patients who are receiving other drugs.

2. Adverse Reactions

- 1) When adverse reactions including redness, rash, diarrhea, anorexia, gastric discomfort, nausea, vomiting, or stomatitis occur, administration should be discontinued and consult a pharmacist or a physician (dentist).
- 2) Skin: Stevens-Johnson syndrome, Lyell syndrome may occur. Monitor closely and if fever, erythema, itch, red eye, stomatitis occur or severe symptoms including rash + flare, burnt mark hydrops with hyperthermia occur in whole body skin, mucous layer of mouth and neck, discontinue the administration immediately and ask a physician or a

pharmacist. Also, in case severe symptoms as mentioned above occur rarely, contact a physician immediately.

3. General Precautions

- 1) Keep the recommended dosage and administration.
- 2) Caution should be exercised when administered to children.
- 3) If the improvement of the symptom is not evident about one month after the administration of the drug, consult with a physician (dentist) or a pharmacist.
- 4) This drug is not recommended for children younger than 7 years of age.

4. Precautions for Storage

- 1) Keep out of the reach of children.
- 2) Store in cool and dry place away from direct sunlight.
- 3) This drug should not be stored in other container to avoid misuse and to maintain the quality of the drug.

【STORAGE】

Store in well closed container at room temperature.

【HOW SUPPLIED】

30 Caps., 60 Caps., 120 Caps. / Case

- ※ This product has been very strictly controlled in its quality.

<http://www.myunginph.co.kr>

ITC 0906-18



Manufactured & Distributed by
MYUNG IN PHARM.CO.,LTD.
Gyeonggi-do, KOREA