

# 활성형 종합비타민제

# 비오라민 정

Biolamin Tab.

분류번호 : 316 (혼합비타민제<비타민AD혼합제를 제외>)

비오라민정은 인체에서 부족되기 쉽고 신경과 근육의 각종 대사에 중요한 역할을 담당하는 활성형 비타민 B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub> 등의 비타민 B군과 비타민 C, E가 복합처방된 활성형 종합비타민제입니다.

특히, 비오라민정은 비타민 B군 4종이 일반 비타민에 비해 흡수율이 양호하고 효과가 지속적인 활성형으로 함유되어 있어 피로회복, 신경통, 요통, 건통, 병중·병후, 노년기, 발육기, 임신·수유기 등에 좋은 종합 영양제입니다.

## 【원료약품 및 그 분량】 1정중

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| 푸르셀티아민(활성비타민 B <sub>1</sub> )(식품의약품안전청고시) .....          | 50mg   |
| 낙산리보플라빈(활성비타민 B <sub>2</sub> )(약전) .....                 | 2.5mg  |
| 인산 피리독살(활성비타민 B <sub>6</sub> )(식품의약품안전청고시) .....         | 2.5mg  |
| 초산 히드록소코발라민(활성비타민 B <sub>12</sub> )(약전) .....            | 5.22μg |
| (히드록소코발라민으로서 5.0μg)                                      |        |
| 직타용 아스코르빈산(비타민 C)(별규) .....                              | 72.2mg |
| (아스코르빈산으로서 70mg)                                         |        |
| 초산 토코페롤 50%(비타민 E)(식품의약품안전청고시) .....                     | 40mg   |
| (초산 토코페롤로서 20mg)                                         |        |
| 첨가제(타르색소): 적색40호, 알루미늄레이크, 황색23호, 알루미늄레이크, 청색2호, 알루미늄레이크 |        |

## 【성상】 적색의 타원형 필름코팅정

## 【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 E, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, C의 보급
  - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
  - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등)
  - 각기, 눈의 피로

## 【용법·용량】

성인 1회 1정씩 1일 2회 복용합니다.

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
  - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
  - 2) 3개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
  - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 2) 과수산노증환자(hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
  - 3) 임부·수유부

### 3. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.  
: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은변, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 페리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 염산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 $\mu$ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.

### 4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.

### 5. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 뇨검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 뇨를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

### 6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

### 【저장방법】

기밀용기, 실온보관

### 【포장단위】

100, 500정

### 【제품문의처】

소비자 상담실 : 080-587-7575(수신자 요금부담)

※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

설명서 개정년월 : 2008.07

<http://www.myunginph.co.kr>

BOT 0708-11



※ 본 의약품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 본 의약품과 함께 보관하십시오.