일반의약품

종합소화효소제

하이라제정

Hi-Lase Tab.

분류번호 : 233(건위소화제)

하이라제정은 지방, 탄수화물, 단백질 성분을 신속히 소화시키는 소화효소제인 리파제Ⅱ 및 비오디아스타제 2000 I 과 담즙의 분비를 촉진하여 소화를 도와주는 이담소화제 우르소데스옥시콜린산의 복합처방으로서 과식, 위체, 식욕부진(식욕감퇴), 소화불량, 소화불량에 따른 위부 · 복부팽만감 등에 효과적인 종합소화효소제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정중

리파제Ⅱ(식품의약품안전청고시)····· 5mg
(지방소화력으로서 33.7단위)
비오디아스타제 2000 I (식품의약품안전청고시)····· 5mg
전분당화력(pH 5.0) 87.5단위
전분호정화력(pH 5.0) 180단위
단백소화력(pH 3.0) 66.3단위
단백소화력(pH 8.0) 127.5단위
우르소데스옥시콜린산(약전)····· 10mg

【성상】

백색의 원형 필름코팅정제

【약리작용 및 특징】

1. **리파제 II**
   리파제Ⅱ는 Aspergillus속 사상균에서 추출정제한 지방소화효소로서 pH 2.0~10의 넓은 영역에서 안정하게 지속적으로 작용합니다.
2. **비오디아스타제 2000 I**
   비오디아스타제 2000 I 은 Aspergillus속 사상균에서 추출정제한 복합소화효소로서 탄수화물, 단백질 및 섬유소 소화작용을 나타냅니다.
3. **우르소데스옥시콜린산**
   우르소데스옥시콜린산은 웅담 성분을 화학적으로 합성한 담즙산성분으로서 담즙분비를 촉진하여 지방의 소화를 도와줍니다.
4. **종합소화효소제**
   하이라제정의 리파제Ⅱ와 비오디아스타제 2000 I 은 지방, 탄수화물, 단백질 성분을 모두 소화시키는 소화효소제이며, 우르소데스옥시콜린산은 담즙분비를 촉진하여 지방의 소화를 도와주는 웅담성분의 합성담즙산으로 음식물의 소화는 물론 기타 원인으로 발생된 소화불량에 매우 우수한 효과를 나타내는 종합소화효소제입니다.

【효능 · 효과】

- 소화불량 • 소화불량에 의한 위부 · 복부팽만감
- 과식 • 위체, 가슴이 답답함
- 식욕부진(식욕감퇴), 소화촉진

【용법 · 용량】
성인(15세 이상)은 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사에게 상담하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 사람

2. 복용에 있어 다음 사항에 주의하십시오.
1) 이 약은 정해진 용법 · 용량을 엄수하십시오.

3. 복용중 또는 복용후에 다음 사항에 주의하십시오.
1) 이 약의 복용에 의해 드물게 연변, 하리를 발생하는 경우가 있습니다.
2) 2주간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않는 경우는 일시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사에게 상담하십시오.

4. 보관 및 취급상의 주의
1) 소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
2) 직사일광을 피해, 가능한한 습기가 적고 시원한 장소에 밀전하여 보관하십시오.
3) 용기내의 충진물은 수송중의 정제파손 방지용이므로 개전후에는 버리십시오.
4) 오용을 피하고, 품질을 유지하기 위해, 타용기에 넣지 마십시오.
5) 사용기한(외부용기에 기재)을 넘은 경우에는 사용하지 마십시오.

【저장방법】
기밀용기, 실온보관

【포장단위】
100, 1000정

【제품문의처】
소비자 상담실 : 080-587-7575(수신자 요금부담)

※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

설명서 개정연월 : 2005. 09.

http://www.myunginph.co.kr

HLT 0905-05

제조판매원
명인제약주식회사
경기도 화성시 팔탄면 노하리 186-1

※ 본 의약품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 본 의약품과 함께 보관하십시오.