일반의약품

혈전증치료제
보령 아스트릭스® 캅셀 100mg
(아스피린)

보령 아스트릭스® 캅셀 100mg은 아스피린 장용피 입자로서 체내에서 서서히 저농도로 방출되도록 만들어진 제제입니다. 아스피린이 저농도로 흡수되면 체내의 혈소판응집 억제물질인 Prostacyclin의 합성에는 거의 영향을 주지않고 혈소판 Cyclooxgenase를 불활성화시켜 혈소판응집 매개물질인 Thromboxance A₂의 생성을 선택적으로 억제함으로써 혈전증치료효과를 발휘합니다. 또한 저농도로 서서히 방출되는 아스피린 장용피 입자는 아스피린의 부작용인 위장출혈, 구역, 구토등의 부작용을 개선시켜줍니다.

성분 · 함량

1캅셀중
아스피린 장용피입자(별규) 120.98mg
(아스피린으로서 100mg)

● 성상 : 백색의 장용피구형입자가 든 상 · 하 주황색의 투명한 경질캅셀제

약리작용 및 특징

1. 혈전을 예방합니다.
   아스트릭스®는 혈전생성을 억제하여 혈전색전증 및 일과성 허혈발작 치료에 좋습니다.
2. 약효가 지속적입니다.
   아스트릭스®는 pellet타입의 아스피린 제제로서 투여후 주성분이 낮은 농도로 지속적으로 방출, 흡수되므로 1일 1캅셀로 효과가 지속됩니다.
3. 혈전증치료에 효과적인 아스피린 제제입니다.
   아스트릭스®은 투여후 약 30~50%정도가 살리실산으로 분해되는데 살리실산은 아스피린과 경쟁적으로 혈소판에 작용하여 혈소판 응집 억제효과를 방해합니다.
4. 아스피린의 위장장애를 개선시켰습니다.
   아스트릭스®는 장용성 pellet타입의 캅셀제이므로 아스피린의 부작용인 위출혈, 구역, 구토등을 개선시켰습니다.

효능 · 효과

혈전색전증 및 일과성 허혈 발작

용법 · 용량

성인 : 아스피린으로서 1일 1회 100mg을 경구투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약 또는 다른 살리실산제제에 과민증의 병력이 있는 환자
   2) 소화성궤양 환자
   3) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자
   4) 혈우병 환자
   5) 중증의 간장애 환자
   6) 중증의 신장애 환자
   7) 중증의 심기능부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 신장애 또는 그 병력이 있는 환자
   2) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자
   3) 심부전 환자
   4) 출혈경향이 있는 환자(혈소판기능이상을 일으킴)
   5) 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자
   6) 기관지천식 환자
   7) 수술전 환자
   8) 항응고제를 투여받고 있는 환자
   9) 다른 약물에 과민증의 병력이 있는 환자
   10) 고령자
3. 부작용
   1) 쇽 : 쇽 및 아나필락시양증상(호흡곤란, 전신홍조, 혈관부종, 두드러기 등)이 나타나는 경우에는 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는

투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오. 이 약은 천식발작을 유발할 수 있습니다.

2) 과 민 증 : 때때로 발진, 부종, 두드러기, 비염양 증상, 결막염 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.

3) 피 부 : 드물게 중독성 표피괴사증(Lyell 증후군), 피부점막안증후군(Stevens-Johnson증후군), 박리성피부염 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

4) 혈 액 : 드물게 재생불량성 빈혈, 빈혈, 백혈구감소, 혈소판감소, 혈소판기능저하(출혈시간의 지연)등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 있을 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

5) 소화기계 : 식용부진, 가슴쓰림, 위통, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있고 장기투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장관출혈, 소화성 궤양 및 천공이 나타날 수 있습니다.

6) 정신신경계 : 이명, 난청, 어지러움, 두통, 흥분 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 감량하거나 투여를 중지하십시오.

7) 간 장 : 드물게 간장애가 나타날 수 있습니다.

8) 신 장 : 드물게 신장애가 나타날 수 있습니다.

9) 과량투여 : 이 약을 과량투여할 경우에는 살리실산 중독을 일으키며, 중증일 경우에는 환각, 경련, 혼수, 호흡마비, 순환기장애 등을 일으켜 사망할 수 있습니다.

10) 기 타 : 과호흡, 대사성 산증 등이 나타날 경우에는 혈중농도가 현저하게 상승될 수 있으므로 감량하거나 투여를 중지하십시오.

4. 일반적 주의

1) 살리실산제제와 레이증후군과의 인과관계는 명확하지 않으나 관련성이 있다는 역학조사보고가 있으므로 14세이하의 수두 또는 인플루엔자 환자에는 부득이한 경우에 한하여 신중히 투여하고, 투여후 환자로 14세이하의 수두 또는 인플루엔자 환자에는 부득이한 경우에 한하여 신중히 투여하고, 투여후 환자의 상태를 충분히 관찰하십시오. (레이증후군 : 소아에 있어 매우 드물게 수두, 인플루엔자 등의 바이러스성 질환에 뒤이어 심한 구토, 의식장애, 경련(급성뇌부종), 간이외의 장기에 지방침착, 미토콘드리아변형, AST, ALT, LDH, CPK의 급격한 상승, 고암모니아혈증, 저프로트롬빈혈증, 저혈당 등의 증상이 단기간에 발현하는 증세로 사망율이 높음)

2) 장기투여하는 경우에는 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능 검사 등)를 하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 휴약 등의 적절한 처치를 하십시오.

3) 수술전 1주 이내에 이 약을 투여한 예에서 손실혈액량의 유의성 있는 증가가 보고되었습니다.

4) 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하며 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의하십시오.

5. 상호작용

1) 쿠마린계 항응혈제(와르파린), 혈당강하제(인슐린제제, 톨부타미드 등)와 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여하십시오.

2) 프로베네시드와 병용투여시 요산배설작용이 억제됩니다. 치아짓계 이뇨제의 작용을 감소시킬 수 있습니다.

3) 메토트렉세이트와 병용투여시 그 혈액학적 독성을 증가시키므로 병용투여하지 않습니다.

4) 리튬제제와의 병용에 의해 리튬의 혈중농도가 상승하여 리튬중독이 나타났다는 보고가 있으므로 병용시에 관찰을 충분히 하고 신중히 투여하십시오.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물 실험에서 기형 발생이. 사람에는 임신 말기에 투여한 환자와 신생아에서 출혈 이상이 나타났다는 보고가 있으므로 임부(12주 이내 또는 임신 말기) 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여하십시오.

2) 임신 말기의 랫트에 투여한 실험에서 태자의 동맥관 수축이 보고되어 있습니다.

3) 이 약은 유즙으로서의 이행이 일어나므로 수유부에는 투여하지 마십시오.

7. 소아에 대한 투여

소아에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

8. 고령자에 대한 투여

고령자에는 부작용이 나타나기 쉬우므로 소량부터 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하십시오.

9. 적용상의 주의

1) 장용피막을 파손하지 않도록 유의하십시오.

2) 탄산수소나트륨, 탄산마그네슘 등의 알칼리제제와 배합하지 마십시오.

3) 가능한 한 습윤하기 쉬운 제제와는 배합하지 마십시오.

저장방법 밀폐용기, 실온보관

포장단위 10, 100, 300, 500, 1000캅셀

※ 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 오손된 제품은 구입한 약국, 병원을 통하여 교환하여 드립니다.
본 제품은 소비자피해보상규정 (재정경제부고시) 에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
본 제품에 대한 의문사항은 당사 소비자상담실 수신자부담전화 080-708-8088로 문의하십시오.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.

150203

제조 및 판매
BORYUNG
보령제약주식회사
경기도 안산시 단원구 신길동 1122-3
www.boryung.co.kr

Licensed by
F.H.Faulding & Co., Limited
Thebarton, South Australia