전문의약품
분류번호 : 141

졸리지 않는 항히스타민제

보령 에바스텔® 정

(에바스틴)

에바스텔정은 기관지 평활근, 모세혈관 중의 H_1-receptor에서 histamine과 경쟁적으로 작용하여 histamine에 의한 증상을 완화시키는 항히스타민제입니다. 특히, 기존의 제제와는 달리 상용량에서 졸음을 유발하지 않으며, 1일 1회 1정의 복용이므로 사용이 간편한 제제입니다.

성분 · 함량

1정 중

에바스틴(별규) ····· 10.0mg

● 성상 : 백색의 장방형의 필름코팅정

약리작용 및 특징

1. 말초혈관의 H_1-receptor에서 histamine의 작용을 상경적으로 억제함으로써 알러지성 비염, 두드러기 등의 증상을 신속히 완화시켜 줍니다.
2. 상용량에서 졸음을 유발하지 않으므로 운전 등 정신집중을 요하는 경우에도 안심하고 복용하실 수 있습니다.
3. 약효가 24시간 지속되므로 1일 1회 1정 투여로도 충분한 효과를 발휘합니다.

효능 · 효과

알레르기성 비염 · 결막염 · 피부염, 만성두드러기

용법 · 용량

성인 및 12세 이상의 소아 : 에바스틴으로서 1일 1회 10mg을 경구투여합니다.
6-11세 소아 : 이 약으로서 1일 1회 5mg을 투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

1. 경고
   이 약에는 젖당이 포함되어 있으므로 소아 및 청소년기에서 젖당에 대한 과민반응이 보고되었습니다. 물론 과민반응을 일으키기에는 아주 적은 양이지만 만약 설사증세가 나타날 경우에는 의사와 상의합니다.
2. **다음 환자에는 투여하지 마십시오.**
   이 약에 과민증 환자
3. **다음 환자에는 신중히 투여하십시오.**
   간장애 또는 그 병력이 있는 환자(간장애를 악화시키거나 재발시킬 수 있습니다.)
4. 부작용
   1) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
   2) 정신신경계 : 졸음, 신경과민, 마비감, 무력증, 흥분, 때때로 권태감, 드물게 두통이 나타날 수 있습니다.
   3) 소화기계 : 구역, 구토, 복통 때때로 구갈, 위부불쾌감, 드물게 이구공내건조, 설염, 설사, 변비가 나타날 수 있습니다.
   4) 간 : 때때로 AST · ALT, LDH, Al-P의 상승이 나타날 수 있습니다.
   5) 과민증 : 발진, 부종이 나타날 수 있습니다.
   6) 기타 : 경미한 체중증가, 호산구증다증, 흉부압박감, BUN 상승, 당뇨가 나타날 수 있습니다. 유사약(테르페나딘 등)에 의해 QT 연장, 심실성 부정맥(토르사드 드 포인트 포함)이 나타났다는 보고가 있습니다.

5. **일반적 주의**

1) 대부분의 환자에서 이 약을 복용한 후 졸음을 경험하지 않았으나 자동차 운전 혹은위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하는 사람은 이 약에 대해 자신의 반응이 익숙할 때까지 주의할 필요가 있습니다.
2) 이 약의 치료효과는 투여후 1-3시간 후에 나타나므로 응급한 알레르기 반응에는 사용하지 않습니다.
3) 이 약을 계절성 환자에 투여하고자 할 때에는 호발계절을 고려하여 그 직전에 투여를 시작하고 호발 계절의 종료시까지 계속하여 투여하는 것이 바람직합니다.
4) 장기 스테로이드 요법을 받고 있는 환자에서 이 약 투여에 의해 스테로이드를 감량하고자 하는 경우에는 충분한 관리하에 천천히 합니다.

6. **상호작용**

1) 다른 항히스타민제의 효과를 증강시킬 수 있습니다.
2) 에리스로마이신과 병용투여시, 에리스로마이신이 이 약의 대사를 억제하여 혈중 농도를 2배 상승 시켰다는 보고가 있습니다.

7. **임부 및 수유부에 대한 투여**

1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 신중히 투여합니다.
2) 동물실험(랫트)에서 이 약이 유즙으로 이행된다는 보고가 있으므로 이 약을 투여중에는 수유를 중단합니다.

8. **소아에 대한 투여**

6세 미만의 유아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

9. **임상검사치에의 영향**

이 약은 알레르겐 피내반응을 억제하므로 알레르겐 피내반응검사를 실시하기 전에는 이 약을 투여하지 않습니다.

10. **과량투여시의 처치**

1회 50-90mg(적정치료량의 5-9배) 투여시에도 별다른 독성은 나타나지 않았으며, 사람에 있어서 중독사고는 보고되지 않았습니다. 처치로는 위세척과 증상에 따른 적절한 치료가 요구됩니다.

저장방법 기밀용기, 실온보관

포장단위 2, 10, 20, 100, 300정

※ 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품은 소비자피해보상규정(재정경제부고시)에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다. 본 제품에 대한 의문사항은 소비자상담실 수신자 부담전화 080-708-8088로 문의하십시오.
※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.
※ 이 첨부문서 작성일자(2004년 2월 12일)이후 변경된 내용은 080-708-8088에서 확인할 수 있습니다.

120204

제조 및 판매
BORYUNG
보령제약주식회사
경기도 안산시 단원구 신길동 1122-3
www.boryung.co.kr

Licensed by
Almirall
Almirall Prodesfarma, S.A.
Barcelona, Spain