일반의약품

분류번호:234

속쓰림/위염/구역/가스제거에

겔포스엠®

콜로이드성 인산알루미늄겔제제 현탁액

겔포스엠®은 수용액중 미립자상태의 콜로이드성 인산알루미늄에 수산화마그네슘, 시메치콘을 첨가하여 변비 등의 부작용발현을 감소시키고, 제산작용 및 장내 가스제거 효과를 증강시킨 콜로이드성 겔제제입니다. 특히 **겔포스엠®**에는 겔상의 Agar-agar, Pectin이 복합처방되어 각 성분간의 상호 상승작용으로 인산알루미늄 단일제제인 경우보다 우수한 위점막 피복보호작용을 발현하여 각종 위장질환에 수반되는 위통, 속쓰림, 위부불쾌감 등이 개선됩니다.

성분 • 함량 100g중

인산알루미늄 겔 (F.P.)	61.9g
(인산알루미늄으로서 12.38g)	
수산화마그네슘 (U.S.P.)	2.0g
(마그네슘으로서 833.5mg)	
시메치콘 (U.S.P.)	0.2 g
한천 (약전)	적량
펙틴 (U.S.P.)	적량
파라옥시안식향산메칠 (약전)	0.08g
파라옥시안식향산프로필 (약전)	0.02g

● **성 상 :** 이 약은 백색-담백색의 겔로서 물로 희석하면 곧 균질의 현탁액이 된 다음 서서히 침강합니다.

약리작용 및 특징

1. 인산알루미늄을 미립자상태로 수용액중에 균등하게 콜로이드화하고 점성이 높은 천연겔인 Pectin, Agar-agar를 복합처방한 콜로이드성 겔제제로서 소화관점막에 대한 피복보호작용이 있습니다.
2. 제산작용이 있어 과잉의 산(HCl)을 중화할 뿐 아니라 위내 pH를 pH 3.5~5.0 사이로 계속 유지시켜 주는 완충효과가 있어 소화에 지장을 주지 않으며, 2차적으로 산반동을 일으키지 않습니다.
3. Al염과 Mg염을 적절히 배합함으로써 제산효과가 증대되었으며, 상호 보완적으로 작용하여 위장관계 부작용의 발생이 감소되었습니다.
4. 시메치콘은 표면장력을 저하시키는 작용으로 위장관내의 과도한 가스를 미세하게 분산시켜 복부의 불쾌감을 제거시켜 줍니다.
5. PO_4^{-3}의 효소활성에 대한 촉매적 항진작용으로 인해 손상된 점막의 점액분비 및 세포대사를 항진시켜 육아신생작용을 발현합니다.
6. 콜로이드상으로 분산된 제제로서 장내에서 이상발효된 Gas나 세균, 독소, 바이러스 등을 흡착 · 중화시켜 줍니다.
7. 인체내에서 흡수되지 않아 장기복용시 알루미늄 축적증(신부전, 뇌수종 등)이 유발되지 않으며, 자체내에 PO_4^{-3}가 함유되어 있어 기존 알루미늄 제제에서 유발되는 인결핍증(골연화증, 근무력증, 권태감)이 발현되지 않습니다.
8. 산뜻한 오렌지향의 휴대용 포장으로 필요시마다 간편하게 복용할 수 있습니다.

효능 • 효과

위산과다(위염,위 · 십이지장궤양에 관련된 것도 포함), 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 가스제거

gelfos M®

용법 · 용량

성인 1회 1포(20g), 1일 4회 식간 및 취침시 복용합니다.
소화성 궤양환자는 위산분비량 및 위 내용물의 양에 따라 용법 · 용량을 조절합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 사람은 복용하기 전에 약사 또는 의사와 상의하십시오.
   1) 의사의 치료를 받고있는 사람
2. 복용할 때는 다음 사항에 주의하십시오.
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
   2) 이 약은 3개월 미만의 유아에게는 복용시키지 마십시오. 또 3개월 이상이라도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 마십시오.
3. 복용중 또는 복용후 다음 사항에 주의하십시오.
   1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.
   2) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 때에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
4. 보관 및 취급상의 주의
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사광선을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관하십시오.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위 20g × 4포

※ 제품의 특성상 유통과정 중 점성이 증가될 수 있습니다.
※ 만약, 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 약국 · 병원을 통하여 교환하여 드립니다.
본제품은 소비자피해보상규정(재정경제원고시)에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
본제품에 대한 문의사항은 당사 소비자상담실 수신자부담전화 080)708-8088로 문의하십시오.
※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사와 상담하십시오.

201002

제조 및 판매
BORYUNG
보령제약주식회사
경기도 안산시 신길동 1122-3
www.boryung.co.kr