일반의약품
분류번호:141

알러지성비염 · 감기 –

리노에바스텔® 캅셀

리노에바스텔® 캅셀은 H_1-receptor에서 histamine과 경쟁적으로 작용함으로써 histamine에 의해 유발되는 알러지성 증상을 완화시키는 항히스타민제인 ebastine함유 속방출형 미세과립과 교감신경흥분작용에 의한 효과적인 비충혈제거제(코막힘 제거)인 pseudoephedrine함유 서방출형 미세과립을 복합하여 지속적인 작용을 나타내며, 부작용 발생가능성을 감소시킨 제제입니다.

성분 · 함량

1캅셀중

에바스틴 구형과립(별규) ····· 110.0mg
(에바스틴으로서 10.0mg)
염산슈도에페드린 구형과립(별규) ····· 200.86mg
(염산슈도에페드린으로서 120.0mg)

● 성상 : 상하부 적색의 경질캅셀이며, 내용물은 백색 및 회백색의 구형과립입니다.

약리작용 및 특징

1. **리노에바스텔**은 기관지평활근, 말초 모세혈관의 H_1-receptor에서 histamine의 작용을 경쟁적으로 억제함으로써 알러지성 비염 등의 증상을 신속히 완화시켜 줍니다.
2. **리노에바스텔**은 알러지성 비염의 주증상중 하나인 코막힘을 효과적으로 제거하며 독성발생가능성이 적은 완만한 유효 혈중농도를 유지하므로, 심계항진,두통 등의 부작용을 일으킬 가능성이 감소되었습니다.
3. **리노에바스텔**은 상용량에서 졸음을 유발하지 않으므로 운전등 정신집중을 요하는 경우에도 안심하고 복용하실수 있습니다.

효능 · 효과

혈관운동성, 알러지성 비염 및 감기에 관련된 비염증상의 치료

용법 · 용량

청소년(12-17세사이) : 1일 1회 1캅셀
성 인 : 1일 1회 1캅셀, 심한 경우 1일 2회 1캅셀 투여
치료지속기간은 증상이 심한 경우에 한하며, 일반적으로 의사의 지시없이는 10일이상 지속하지 않아야 합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약에 과민증인 환자
   2) 이 약은 슈도에페드린이 함유되어 있으므로, 협우각성 녹내장, 뇨저류, 중증 고혈압, 관상부전, 갑상선기능항진증을 가진 환자 및 모노아민옥시다제 저해제(IMAO)로 치료받고 있는 환자 또는 2주간 치료를 받은 환자
   3) 12세 이하의 어린이
   4) 임부 및 수유부

2. 다음의 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 녹내장

2) 고혈압

3) 심질환환자

4) 당뇨병 (이 약은 서당 106.64mg을 함유하므로 특히 주의해야 합니다.)

5) 전립선 비대증 환자

6) 60세 이상의 노인

3. 부작용

이 약은 에바스틴이 함유되어 있으므로 드물게 두통, 의기소침, 과민증, 위장장애, 설사, 변비를 일으킬 수 있습니다. 슈도에페드린 때문에 특히 교감신경흥분제에 과민증인 환자에서, 구강건조, 과민증, 흥분, 불면, 현기, 두통이 나타날 수 있고, 장기투여시 오심, 구토를 일으킬 수 있습니다. 또한 빈박, 동계를 일으킬 수 있으며, 기타 다른 증상이 나타나면 의사와 상담해야 합니다.

4. 상호작용

1) 이 약은 피부알러지시험을 방해할 수 있으므로, 치료중단후 5-7일 후까지는 실시되어서는 안됩니다.

2) 이 약은 다른 항히스타민제의 효과를 증강시킬 수 있습니다.

3) 이 약은 모노아민옥시다제 저해제(IMAO) 병용 투여시 심각한 혈관성 고혈압을 일으킬 수 있으므로 병용 투여하지 않아야 합니다. 또한, 다른 약물(메칠도파, 메카밀아민, 리서핀, 맥각 알칼로이드)의 혈압강하효과를 감소시킬 수 있습니다.

4) 다른 교감신경흥분성 약물과의 병용투여는 상가효과를 일으키며, 독성을 증가시킬 수 있습니다. 유사하게 일부의 항고혈압제(베타-차단제)와 상호작용할 수 있습니다.

5) 이 약의 성분이 알코올의 효과를 증대시키지 않습니다.

5. 과량투여시의 처치

이 약의 과량투여의 경우 위장관 세척과 증상 치료 및 생명을 유지하는데 필요한 치료를 긴급하게 시행해야 합니다.

6. 운전과 기계사용능력에 대한 효과

다른 임상시험 결과 에바스틴 90mg까지의 단일투여와 30mg의 다중투여에서 중추신경계에 대해 임상적으로 관련 있는 효과가 입증되지 않았습니다.

저장방법 밀폐용기, 실온보관 (1~30℃)

포장단위 3, 10, 100캅셀

※ 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
본제품은 소비자피해보상규정(재정경제부고시)에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
본제품에 대한 문의사항은 당사 소비자상담실 수신자부담전화 080)708-8088로 문의하십시오.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.

081403

제조원
Almirall Prodesfarma
Barcelona, Spain

소분판매원
BORYUNG
보령제약주식회사
경기도 안산시 단원구 신길동 1122-3
www.boryung.co.kr