

트리진 정

(염산트리메타지딘)

성분 · 함량

1정중

염산트리메타지딘 (KP) 20mg

● 성상 : 이 약은 주황색의 필름코팅 정제이다.

특징

- 트리진은 세포에서 항허혈작용을 하는 제제로 심근에 산소공급을 최적화시키며 심근 장기를 보호합니다.
- 트리진은 심장에서 특이적으로 Na^+/K^+ -ATPase의 활성을 억제하여 세포의 전위차를 유지시켜 줍니다.
- 트리진은 허혈시 발생하는 free radical을 길항하는 작용으로 독성을 경감시키며 허혈로 인해 손상된 세포막의 기능을 회복시켜 줍니다.

효능 · 효과

1. 심혈관계 : 협심증
2. 안과 : 허혈로 인한 맥락망막 질환
3. 이비인후과 : 혈전성 어지러움, 메니에르병성 어지러움, 이명

용법 · 용량

성인 : 염산트리메타지딘으로서 1회 20mg 1일 2회 경구투여 하십시오. 1일 60mg까지 증량할 수 있습니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

사용상의 주의사항

1. 부작용
 - 1) 정신신경계 : 때때로 두통, 권태감 드물게 비틀거림 등이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
 - 3) 소화기계 : 때로 구역, 위부 불쾌감, 식욕부진 등이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 간장 : 드물게 ALT, AST 상승 등이 나타날 수 있습니다.
2. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
 - 2) 모유로의 이행이 보고되지 않았으나 많은 약들이 모유로 이행되므로 수유중에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
3. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

저장방법

기밀용기, 실온보관

포장단위

30정, 100정

- ※ 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품은 소비자피해보상규정 (재정경제부고시) 에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다. 본 제품에 대한 의문사항은 당사 소비자상담실 수신자부담전화 080-708-8088로 문의하십시오.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2006년 10월 7일)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자상담실 수신자부담전화 080-708-8088에서 확인할 수 있습니다.

071006

제조 및 판매

BORYUNG

보령제약주식회사

경기도 안산시 단원구 선길동 1122-3

www.boryung.co.kr