



1회요법 광범위 구충제

알콤정

플루벤다졸



「알콤정」은 플루벤다졸 500mg을 주성분으로 하는 1회 요법의 광범위 구충제로서 회충·요충·편충은 물론 십이지장충의 단독감염이나 혼합감염까지 구제해 주는 효과적인 구충제입니다.

성상	연분홍색의 정방형 정제
성분·합량	1정중 플루벤다졸(Flubendazole)(안전본부고시 제96-2호) 500mg
약리작용	1 알콤은 광범위한 구충작용이 있습니다. 알콤은 회충·요충·편충은 물론 십이지장충의 단독감염에서 혼합감염에 이르기까지 광범위한 구충작용을 갖는 효과적인 구충제입니다. 2 알콤은 복용이 간편합니다. 알콤은 성인이나 소아에 관계없이 1회 1정씩을 복용하고 식사와도 관계없이 언제든지 복용할 수 있습니다. 3 알콤은 안전합니다. 알콤은 내약성이 우수하고 부작용 및 독성이 적어 어린이에서 노인에 이르기까지 안심하고 복용할 수 있습니다.
효능·효과	회충·요충·편충·십이지장충의 감염 및 이들 혼합감염증의 구제
용법·용량	성인·소아의 구별없이 1일 1회 1정씩 복용하십시오.
저장방법	밀폐용기
포장단위	1, 2, 4, 100정
	본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 임부
- 2) 이 약에 과민반응을 나타낸 병력이 있는 환자

2. 부작용

- 1) 기생충의 대량감염시 또는 기생충의 배출시 일과성 복통, 설사가 드물게 보고되었습니다.
- 2) 드물게 피진, 발진, 담마진, 혈관부종과 같은 과민반응이 관찰되었습니다.

3. 1세미만의 소아에 대한 투여

1세미만의 소아에 대해서는 적절한 대조시험이 행해진 바 없으므로 기생충감염이 영양상태나 신체발육을 저해하는 경우에 한하여 본제를 투여 합니다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 랫트를 사용한 한 시험에서 태자독성 및 최기형성 작용이 관찰되었습니다.
그러나 여타의 랫트에 대한 시험이나 마우스, 토끼를 사용한 최기형성시험에서는 별다른 변화가 관찰되지 않았습니다.
인체에 대한 사용경험으로 볼 때, 이 약이 최기형성의 위험을 증가시키는 것으로 나타나지는 않았으나, 임부 및 임신가능성이 있는 부인에게는 이 약을 투여하지 않도록 합니다.
- 2) 이 약의 모유중의 이행에 관해서는 알려진 바가 없으나, 이 약 투여시에는 수유를 중단하는 것이 좋습니다.

5. 과량투여

과량투여시에는 복부경련, 구역, 구토 및 설사가 나타날 수 있습니다.
이 약에서 권장되는 최장 치료기간은 3일이나 드물게 포충질환치료를 위해 장기간 대량 투여한 환자에서 가역적인 간기능장애, 간염, 혈액이상 등이 보고되었습니다.
특별한 해독제는 없으며 필요에 따라 20mg/100ml의 과망간산칼륨수용액으로 위세척하거나 활성탄을 투여합니다.

6. 경고

이 약에 함유되어있는 인공감미료 「아스파탐」은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증환자에게는 투여하지 마십시오.

P9811-4



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

고객상담실 : 080-021-1010 (수신자요금부담전화)

● <http://www.ilyang.co.kr>