

어린이 보호용
안전포장 도입!

감기·몸살·인후통·두통·근육통

스파맥[®] 정

(Fursultiamine 20mg보강)

스파맥정은 진통 해열성분인 아세트아미노펜과 신경기능 활성화 성분인 푸르셀티아민(활성형 비타민 B₁)이 복합 처방된 진통 해열제로서 두통, 치통, 생리통은 물론 감기, 몸살, 신경통, 근육통 등 각종 통증성 및 발열성 질환에 대해 진통, 해열작용을 발휘합니다. 또한 스파맥 정은 복용후 신속하게 분해되어 흡수되므로 빠른 시간내에 효과를 나타냅니다.

성분·함량

1정 중
아세트아미노펜(약 전)500mg
푸르셀티아민(식약청고시 제 98-127호)20mg

성상

미황색의 장방형 정제

약리작용

- 1.진통작용
중추신경의 통증감도를 감소시키고 말초에서 Prostaglandin합성억제 및 화학 전달 물질의 작용과 합성을 억제하여 진통작용을 나타냅니다.
- 2.해열작용
시상하부의 체온조절 중추에 작용하여 비정상적으로 높아진 체온에 대해서 해열 효과를 나타냅니다.
- 3.복합작용
푸르셀티아민(활성형 비타민 B₁)이 함유되어 있어 감기, 두통, 신경통 등에 대해 보다 효과적인 진통작용을 나타냅니다.

효능·효과

- 1.주효능·효과
감기로 인한 발열 및 동통, 치통
- 2.다음 질환에서도 사용할 수 있습니다.
두통, 신경통, 근육통, 월경통, 관절통, 류마티스성 동통

용법·용량

성인 : 1일 3회, 1회 1~2정을 복용하십시오.
12세 이하 : 1일3회, 1회 1정씩 복용하십시오.

사용상의
주의사항

- 1.다음 사람은 복용하지 마십시오.
· 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등)을 일으킨 적이 있는 사람
· 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 2.다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1)간장애 환자
2)신장애 환자
- 3.부작용
1)혈액 : 드물게 혈소판 감소, 과립구감소 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오. 또 청색증이 나타날 수 있습니다.
2)과민증 : 과민증상이 나타날 경우에는 중지하십시오.
3)위장 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
장기간 사용시 위장관에 대한 부작용, 특히 출혈, 궤양 및 천공이 나타날 수 있습니다.

4.복용시 주의사항

1)이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

①이 약의 복용 후 곧바로 두드러기,부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우.

②고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우.

③천식이 나타난 경우.

2)바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.

5.일반적 주의

유사화합물 투여에 의해 간질성 신염, 혈색소 이상을 일으킬 수 있으므로 장기투여를 피하십시오.

6.임부에 대한 투여

1)임신중에 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

2)임신 말기의 랫트에 투여한 실험에서 태자의 동맥관 수축이 보고된바 있습니다.

7.소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.

8.과량 투여

간장, 신장, 심근의 과사가 일어날 수 있습니다.

*경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

저 장 방 법

밀폐용기, 실온보관

포 장 단 위

10, 100, 500, 1000정

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 소비자피해보상규정에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

P0612-08

포장
개봉
방법



※앞부분을 위에서 강하게 눌러
호일로 부터 알약을 꺼냅니다.



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr