

어린이 보호용
안전포장 도입!

효과빠른 진통제

스펜탈[®]정

일반의약품

인간생활에서 평생 한번도 동통을 느끼지 않고 지내는 사람은 전혀 없기 때문에 이 동통에 효과적으로 대처하는 것이 중요합니다. 특히 그 중에서 머리에 발생하는 동통인 두통은 매우 흔한 증상중의 하나입니다. 두통의 종류는 다양하며 그 중 가장 잘 알려진 것에는 편두통이 있고, 현대사회가 점점 더 복잡해짐에 따라 긴장성두통, 스트레스성 두통도 증가하는 추세입니다.

스펜탈[®]정은 해열진통작용을 나타내는 아세트아미노펜과 진통효과를 증진시키는 알릴이소프로필아세틸요소 뿐만 아니라, 비타민제 및 위점막보호제가 첨가되어 진통효과를 증진시키고 대사기능을 촉진시켜 피로회복을 도와주며, 위장장애를 개선해 각종 통증 및 발열성질환에 적합합니다. **스펜탈[®]정**은 특히 긴장성 두통, 스트레스성 두통과 같은 신경성 두통에 적합한 해열진통제입니다.

성상
성분·함량

등황색의 장방형 정제

이 약 1정 중

아세트아미노펜(약 전)	400 mg
리보플라빈(약 전)	4mg
알릴이소프로필아세틸요소(K.P.C)	40mg
아스코르빈산(약 전)	50mg
질산치아민(약 전)	8mg
메타규산알루미늄산마그네슘(K.P.C)	100 mg

약리작용

1. 우수한 해열진통작용

아세트아미노펜이 프로스타글란딘의 합성을 억제하고 시상하부의 체온조절중추에 작용하여 해열 및 진통작용을 나타내며, 알릴이소프로필아세틸요소가 대뇌피질 지각령에 작용하여 통증 반응 역치를 상승시켜 진통효과를 증진시켜 줍니다.

2. 피로회복작용

질산치아민, 리보플라빈이 대사기능을 촉진시켜 피로회복을 도와주며 신경기능 활성화 작용을 나타냅니다. 또한, 아스코르빈산이 신체기능을 활성화시키며 세균감염에 대한 방어력을 높여주고 항스트레스 기능을 발휘합니다.

3. 위점막보호작용

제산제인 메타규산알루미늄산마그네슘이 위점막 보호작용을 나타냅니다.

효능·효과

1. 두통, 치통, 발치후 동통, 인후통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통, 타박통, 골절통, 염좌통, 월경통(생리통), 외상통의 진통
2. 오한, 발열시의 해열

용법·용량

성인 1회 1정씩 1일 3회 공복시를 피하여 복용하십시오. 복용간격은 4시간 이상으로 하십시오.

사용상의
주의사항

1. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세이하의 어린이
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 고령자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

2. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
 - 1) 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오. 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시키십시오.
3. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.
 - 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
 - 3) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고, 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 4) 장기 연용하지 마십시오.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
5. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다

포장 단위
저장 방법


10, 100정

밀폐용기, 실온보관

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입하신 약국 또는 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 소비자피해보상규정에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

P0612-03

포장
개봉
방법



※앞부분을 위에서 강하게 눌러
호일로 부터 알약을 꺼냅니다.



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr