

HEALTHFUL LIFE BEAUTIFUL LIFE
MEDICA KOREA

진해거담제

뮤코스텐[®] 100mg 200mg 캡슐

(아세틸시스테인)

MUCOSTEN 100mg/200mg Cap.

분류번호:222



저희 메디카코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 인류의 건강과 아름다운 삶을 위해 우수한 품질의 제품을 공급해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디카코리아 임직원들의 정성이 깃들어 있습니다.

[성분·함량] 1캡슐 중

아세틸시스테인(USP) 100mg/200mg

[성상]

뮤코스텐 100mg캡슐: 흰색의 분말이 든 상부 녹색, 하부 흰색의 경질캡슐제

뮤코스텐 200mg캡슐: 흰색의 분말이 든 상부 암녹색, 하부 담녹색의 경질캡슐제

[효능·효과]

- 1) 다음 질환에서의 객담배출곤란: 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 남성성염증
- 2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이염

[용법·용량]

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여합니다.

1. 급성질환
성인: 1회 200mg 1일 3회
소아: 6~14세 1회 200mg 1일 2회
2~5세 1회 100mg 1일 3회(100mg 캡슐에 한함)
2. 만성질환
성인: 1회 200mg 1일 2회
소아: 6~14세 1회 100mg 1일 3회
3. 남성성염증
소아: 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2~5세 1회 100mg 1일 4회
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 위·십이지장궤양 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
신생아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않습니다.)
3. 부작용
1) 소화기계: 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있습니다.
2) 과민증: 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있습니다.
3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있습니다.
4. 상호작용
경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용투여 시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있습니다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여합니다).
5. 임부에 대한 투여
임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여합니다.
6. 수유부에 대한 투여
이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여합니다.
7. 적용상의 주의
이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 합니다.

[저장방법] 기밀용기

[포장단위] 자사포장단위

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※ 메디카코리아 홈페이지(www.medicakorea.co.kr)를 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 본사 마케팅부((02)2025-0247)또는 개발부((02)2025-0213~5)로 문의바랍니다.

개정일자: 2007. 10. 19

MK0710044

(주)메디카 코리아

경기도 화성시 향남읍 상신리 904-6