KGMP
전문의약품

HEALTHFUL LIFE BEAUTIFUL LIFE
MEDICA KOREA

퀴놀론계 강력 항생제

레록신®정

(레보플록사신)

LEROXINE Tab.

저희 **메디카코리아**는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 아름다운 회사, 불우한 이웃과 장애인을 결코 소홀히 하지 않는 회사, 진정한 제약회사가 되고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나 하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 **메디카코리아** 임직원들의 열과 땀이 배어있습니다.

【성분 · 함량】 1정 중

레보플록사신(별규) ····· 100mg

【약리작용 및 특장점】

- **레록신정**은 폭넓은 항균스펙트럼으로 혐기성균을 비롯한 그람양성균 및 그람음성균에 대하여 광범위하고 강한 항균력과 살균력을 나타냅니다.
- **레록신정**은 세균의 DNA 합성에 필수 효소인 DNA gyrase의 활성을 억제함으로써 DNA의 복제와 전사를 방해하고, 단백합성을 억제합니다.
- **레록신정**은 경구투여후 각 조직에 높은 농도로 신속히 이행하고 호흡기감염증, 요로 · 성기감염증, 장관감염증을 비롯하여 부인과, 피부과, 이비인후과, 외과, 안과, 치과 등의 각종 감염증에 우수한 치료효과를 발휘하며 부작용이 경미합니다.

【성 상】 백색~미백색 원형의 필름코팅정

【효능 · 효과】

포도구균속, 화농연쇄구균, 용혈연쇄구균, 장구균속, 폐렴구균, 펩토스트렙토코카스속, 임균, 대장균, 시트로박테르속, 시겔라속, 엔테로박테르속, 세라치아속, 프로테우스속, 녹농균, 인플루엔자균, 아시네토박테르속, 캄피로박테르속, 클라미디아 · 트라코모나스 중 본제 감수성균에 의한 하기감염증 :

1) 절, 절종증, 옹, 단독, 봉소염, 한선염, 임파관(절)염, 피하농양, 집족성 좌창, 감염성분류, 모낭염, 표저
2) 유선염, 외상 · 열상 · 수술창 등의(표재성) 이차감염, 항문주위농양
3) 인후두염, 급성기관지염, 만성기관지염, 미만성 범세기관지염, 만성호흡기질환의 2차감염, 폐렴, 기관지확장증(감염시), 편도염
4) 신우신염, 방광염, 전립선염, 임균성 요도염, 비임균성 요도염, 부고환염
5) 세균성 적리, 장염
6) 자궁 부속기염, 자궁내감염, 바르톨린선염
7) 안검염, 맥립종, 누낭염, 검판선염, 각막궤양
8) 중이염, 부비강염
9) 치주조직염, 악염
10) 담낭염, 담관염

【용법 · 용량】

보통 성인에 대하여 레보플록사신으로서 1회 100mg(1정)을 1일 2-3회 경구투여합니다. 또, 감염증의 종류 및 증상에 의해 적이 증감하거나, 중증 또는 효과가 불충분하다고 생각되는 경우에는 레보플록사신으로서 1회 200mg(2정)을 1일 3회 경구투여합니다

【사용상의 주의사항】

1. 경고
   외과 수술이 필요하거나 무능력 연장을 일으키는 어깨, 손, 아킬레스건파열이 보고되었습니다. 환자가 통증, 염증, 건파열을 느끼는 경우에는 투여를 중지하십시오. 건염 또는 건파열이 아님이 확실히 진단될 때까지 휴식을 취하고 운동을 삼가하십시오. 건파열은 이 약 투여 중 또는 후 등 언제든지 나타날 수 있습니다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약의 성분 및 오플록사신에 과민증의 병력이 있는 환자
   2) 퀴놀론계 항생물질과 관련된 과민증, 건염, 건파열의 병력이 있는 환자
3. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.
   1) 중증 신장애 환자
   2) 간질 등의 경련성 질환 또는 그 병력이 있는 환자(경련을 일으킬 우려가 있는 환자)
   3) 퀴놀론계 항균제에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
   4) 고령자

4. 부작용

1) 쇽 : 드물게 쇽 증상이 나타난다는 보고가 있으므로 관찰을 충분히 행하고, 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

2) 과민증 : 때때로 발진, 가려움, 드물게 아나필락시양 증상(홍반, 오한, 호흡곤란), 광선과민증, 부종, 두드러기, 열감 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.

3) 정신신경계 : 때때로 불면, 어지러움, 두통 등이 나타날 수 있습니다. 또 오플록사신에서 드물게 경련, 진전, 저린감이 나타난다는 보고가 있습니다.

4) 신장 : 때때로 BUN의 상승이 나타날 수 있습니다. 또 오플록사신에서 드물게 급성신부전이 나타난다는 보고가 있습니다.

5) 간장 : 때때로 AST, ALP, γ-GTP, 총 빌리루빈의 상승, 간기능 장애, 황달(중증 간염이 나타날 수 있습니다.)이 나타날 수 있습니다.

6) 혈액계 : 때때로 백혈구감소, 적혈구감소, 헤모글로빈감소, 헤마토크릿트치감소, 호산구증가, 범혈구 감소증, 용혈성 빈혈(증상 : 헤모글로빈뇨), 혈소판감소 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 나타난 경우에는 투여를 중지하십시오.

7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 복부불쾌감, 설사, 식욕부진, 복통, 복부팽만감 등이 나타날 수 있습니다. 또 드물게 오플록사신에서 위막성 대장염 등의 혈변을 동반한 심각한 대장염이 나타날 수 있으므로 복통, 빈번한 설사가 나타날 경우에는 바로 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.

8) 근육 : 근육통, 무력감, CPK 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로한 급격한 신기능 악화를 수반한 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 주의하십시오.

9) 피부 : 피부점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피괴사증(리엘 증후군)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

10) 호흡기계 : 발열, 해소, 호흡곤란, 흉부X선이상, 호산구증가 등을 동반하는 간질성 폐렴이 나타나는 경우가 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 하십시오.

11) 기타

① 다른 뉴퀴놀론계 항균제에서 드물게 저혈당이 나타나는(고령자, 특히 신장애 환자에서 나타나기 쉽습니다) 수가 있으므로 신중히 투여합니다.

② 발작, 수면장애가 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

1) 소인이 있는 환자에는 발작 또는 다른 중추신경계 부작용이 나타날 수 있음을 주지시키십시오.

2) 통증, 염증, 건파열이 나타날 경우에는 치료를 중지하고 의사에게 알리고 건염 또는 건파열이 아님이 확실히 진단될 때까지 휴식을 취하고 운동을 삼가하십시오.

6. 상호작용

1) 유사화합물(에녹사신 등)에서 펜부펜 등의 페닐초산계 또는 프로피온산계 비스테로이드성 소염진통제와의 병용에 의해 흡수가 저하하고 드물게 경련이 나타난다는 보고가 있으므로 신중히 투여하십시오.

2) 알루미늄 또는 마그네슘 함유 제산제 또는 철분제제와의 병용에 의해 흡수가 저해되고 효과가 감약할 우려가 있으므로 병용은 피하는 것이 바람직합니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 마십시오.

2) 오플록사신에서 모유중으로 이행하는 것이 알려져 있으므로, 수유부에의 투여는 피하는 것이 바람직하지만, 부득이 투여할 경우에는 수유를 중단하십시오

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 마십시오.

9. 고령자에 대한 투여

이 약은 주로 신장에서 배출되는데 고령자는 신기능이 저하되는 경우가 많기 때문에 높은 혈중농도가 지속될 수 있으므로 1회 100mg, 1일 2회 투여량과 투여간격에 유의하여 신중히 투여하십시오.

10. 기타

1) 외국에서 다른 뉴퀴놀론계 항균제의 투여에 의하여 드물게 아킬레스건염, 건파열 등의 건장애가 보고되어 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정될 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

2) 동물실험(어린개, 젊은 성견(13개월), 어린 랫트)에서 관절이상이 나타났다는 보고가 있습니다.

【저장방법】 밀폐용기

【포장단위】 자사포장단위

※저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통하여 제조됩니다. 혹시 사용기한이 경과되었거나, 변질 또는 훼손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.

※제품문의 및 상담 : (02) 842-4760 개발부

MK0206181

(주)메디카 코리아
경기도 화성시 향남면 상신리 904-6