K G M P
적격업체제품

분류번호	239
일 반 의 약 품	

위 · 장관운동 기능조절제

트리마 200 mg 정

(Trimebutine maleate)

트리마는 새로운 개념의 소화기질환치료제로서 위 · 장관운동과 혈관신생을 직접적으로 관장하는 소화관내부신경계(Meissner, Auerbach 신경총)에 선택적으로 작용하여 과도하게 항진되거나 억제된 기능을 부활시키는 양면조절작용에 의해 과민성대장증후군에서 나타나는 변비와 설사의 교대증, 복통과 기능적 소화불량에서 오는 구역, 상복부통이나 팽만감, 느린소화감을 효과적으로 개선시키는 위 · 장관운동기능 조절제입니다.

트리마는 종래의 자율신경계 약물 특히 항콜린제와는 달리 정상적인 장관기능에는 영향을 미치지 않으므로 산동, 발한, 중추기능억제 등 전신적 부작용이 없으며 장기치료 및 유소아, 고령자에게도 안전한 치료제입니다.

【성　　상】 미황색의 원형 정제(황색 4호 함유)

【성분 · 함량】 1정중

Trimebutine maleate(식약청고시) ····· 200mg

【약리작용 및 특징】

1. 위 · 장관운동의 양면조절작용
   소화관내부 신경계에 선택적으로 작용하여 과도하게 항진되거나 억제된 기능을 조절하는 양면작용으로 과민성대장증후군(변비와 설사교대증)과 기능적 소화불량(식후 느린 소화감, 복통, 식욕부진, 구역, 구토증)에 탁효가 있습니다.
2. 진경작용
   Papaverine 등 기존의 진경제가 장운동을 완전히 억제시키는데 반해 Trima는 장운동을 규칙적이고 고르게 하며 Papaverine의 10배나 강력하므로 장관경련해소 등 통증을 제거시켜 줍니다.
3. 연동운동 촉진작용
   연동수축파를 부활 강화시켜 위 · 십이지장의 연동운동을 촉진시키므로 구역, 구토를 개선시켜 줍니다.
4. 국소 마취작용
   Lidocaine과 동등한 마취력을 갖고 있으므로 위부의 경련, 통증을 해소시켜 줍니다.
5. **트리마**는 종래의 자율신경계 약물 특히 항콜린제와는 달리 정상적인 장관 기능에는 영향을 미치지 않으므로 산동, 발한 등 부작용이 없으며 장기치료 및 소아, 노령자에게도 안전한 약입니다.
6. 고질적인 위장병환자에 특히 유효하므로 최소한 10~30일간 복용하여야 효과가 좋습니다.

✻ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품일 경우 병 · 의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환 하시기 바랍니다.

(개정일자 : 2001. 12. 27)

제조발매원

JIN YANG PHARM.CO.

진양제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 서초3동 1532-9
공장 : 경기도 안산시 단원구 초지동 649-3
소비자상담실 : (02)3473-7185

【효능 · 효과】

1. 식도역류 및 열공헤르니아, 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장궤양에 있어서의 소화기능 이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)
2. 과민성대장증후군 및 경련성 결장
3. 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사). 동요자극, 수면장애

【용법 · 용량】

통상 성인 1회 $\frac{1}{2}$~1정씩 1일 3회 식전에 복용합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관

【포장단위】 10, 90, 180, 200, 1000정

【사용상의 주의사항】

1. 부작용
   1) 소 화 기 계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
   2) 순 환 기 계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
   3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
   4) 간 장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
   5) 과 민 증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
2. 임부에 대한 투여
   임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
3. 수유부에 대한 투여
   수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에게는 투여를 피하고 부득이 투유시는 수유를 중지한다.
4. 적용상의 주의
   다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알러지 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.