K G M P
적격업체제품

천연식물성 호르몬/폐경기 장애치료제

분류번호	119
일 반 의 약 품	

지노플러스®정

(GYNO-PLUS)

여성은 폐경기(40~50대)에 이르면 특징적인 여러 증상(홍조, 발한, 우울증, 월경장애 등)을 겪는데 이것은 난소에서 분비되는 에스트로젠의 혈중농도가 급격히 감소되기 때문에 나타나는 증상입니다. 단순한 생리중단 뿐 아니라 여러가지 정신적·신체적 증상을 동반하기 때문에 중년여성의 삶의 질을 높여준다는 의미에서 최근 들어 그 치료에 매우 높은 관심이 집중되는 영역입니다.

폐경기 장애란 단순히 육체적으로 나타나는 증상이 아니기 때문에, 폐경기장애 치료에 있어서 육체적인 증상과 정신적인 증상을 동시에 치료하는 것은 매우 중요합니다. **지노플러스**정의 주성분은 TTG(Triterpene Glycosides)와 히페리시입니다. TTG는 Black Cohosh(학명:Cimicifugae, 생약명:승마)의 정량 추출물로 미국 유럽등지에서 널리 사용되고 있으며, 특히 독일의 FDA에 해당되는 BGA의 생약소위원회인 독일 E 위원회(German Commission E)에 의해서 폐경기 여성의 제반증상을 치료하는데 유용하다는 결론이 내려진 제제입니다. 히페리시 또한 식물성 신경안정제로 안전성과 유용성이 확보된 약물입니다. 특히 1998년 개최된 제1차 아시아 - 유럽 폐경기학회에서 발표된 임상으로 그 효과와 안전성이 세계적으로 입증된 약물입니다.

지난 수십년간 폐경기 여성 치료의 만병통치약으로 군림해온 호르몬대체요법(HRT)이 심각한 부작용을 유발한다는 연구결과가 나왔습니다.
최근 전미의학협회(AMA)의 조사 결과에 따르면 호르몬요법은 유방암, 심장발작, 뇌중풍 발병 확률을 각각 26%, 29%, 41% 높이는 것으로 밝혀졌습니다. 또 호르몬제 사용기간이 길수록 각종 질병의 발병 확률이 높아지는 것으로 나타났습니다.

지노플러스정은 폐경기장애치료제인 승마추출물과 신경안정제인 히페리시의 복합제로서 두성분의 상승작용으로, 폐경기에 나타나는 육체적 및 정신적 증상을 효과적으로 치료합니다. **지노플러스**정은 부작용이 거의 없는 생약성분 의약품으로서, 국내에서 진양제약이 최초로 개발한 제품입니다.

【성분·함량】 1정 중

승마추출액(식약청고시) ·····

히페리시 80% 메탄올 건조엑스(별규) ····· 84mg

【약리 및 특징】

1. **지노플러스**정은 에스트로젠 유사작용 및 신경성 증상 치료작용을 나타냄으로써 폐경기의 에스트로젠 분비감소에 기인되는 여러가지 정신적·육체적 증상을 동시에 치료해 주며, 특히 황체호르몬분비를 직접적으로 차단하고 대뇌의 신경전달물질의 감소를 차단하기 때문에 발한, 홍조, 우울, 불면, 정신신체장애 증후군 등의 질환을 원인적으로 개선해 줍니다.
2. **지노플러스**정은 폐경기 증후군에 사용되는 여성 호르몬제제와 거의 동등한 효과를 나타내기 때문에 호르몬대체요법제로 사용할 수 있을 뿐 아니라 폐경기의 신경성 증상으로 인한 정신 신체장애치료 효과도 임상으로 입증되었습니다.
3. **지노플러스**정은 식물성의 천연 에스트로젠 대체 물질과 생약성 신경증상 치료제의 복합제제이기 때문에 유방암, 자궁암 발생우려 등의 치명적인 부작용이 없고 정량화된 제제로 장기간 일정량을 투여할 수 있으므로 더욱 안정적인 효과를 볼 수 있습니다.
4. **지노플러스**정은 폐경기의 여성에게 뿐만이 아니라 젊은 여성에게서도 나타나는 여성 호르몬 실조 증상에 적절히 응용할 수 있는 제제입니다. 따라서 난소적출술이나 자궁적출술, 기타 여성 호르몬 이상에 기인되는 제반 증세를 지닌 여성에게 광범위하게 적용될 수 있습니다. 특히 폐경기환자의 경우에는 여타의 에스트로젠 복용환자에게서 나타나는 생리유도 현상이 나타나지 않기 때문에 환자의 순응도가 더욱 높은 제제입니다.

※최신의 정보확인 방법 : 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 본사 소비자 상담실에서 확인할 수 있습니다.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환 하시기 바랍니다.

(개정일자 : 2004. 3. 26)

JIN YANG PHARM.CO.
제조발매원
진양제약주식회사
본사 : 서울특별시 서초구 서초3동 1532-9 (T:(02)3470-0300)
공장 : 경기도 안산시 단원구 초지동 649-3 (T:(031)494-8196)
고객상담실 : (02)3473-7185 홈페이지 : www.jinyangpharm.com

【성　　상】

어두운 녹색의 원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

폐경기의 다음 증상

- 홍조, 발한, 의욕저하
- 의기소침, 정신적 긴장, 신경과민, 집중력 부족, 불면, 불안 또는 불쾌함 등의 자율신경 장해
- 생리전의 불수의적(psychovegetative) 이상증상

【용법 · 용량】

1회 1정씩 1일 2회, 필요시 1회 2정씩 1일 2회 복용
아침, 저녁 씹지 않고 물과 함께 복용한다.

【저장방법】

기밀용기, 실온보관

【포장단위】

60, 120, 500정

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 이 약의 성분에 과민한 환자
   2) 기지의 피부 광과민성 환자
   3) 임부 및 수유부 (사용경험이 충분하지 않다.)
2. 부작용
   1) 햇볕에 대한 피부의 민감성이 증가하는 광과민 반응이 특히, 피부가 흰사람에게서 유발될 가능성이 있다.
   2) 드물게 피로, 불안, 위장관 장애가 나타날 수 있다.
3. 상호작용
   이 약은 사이토크롬 P450 대사효소를 유도하므로 이 효소에 의해 대사되는 다음 의약품의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다. 따라서 다음 의약품과의 병용은 가능하면 피하고 부득이하게 병용시는 부작용 발현 여부 및 아래 사항에 주의해야 한다.
   1) HIV 프로테아제 저해제(인디나비르, 사퀴나비르, 리토나비르, 넬피나비르, 암프레나비르 등) 등 항레트로바이러스약(에파비렌츠, 네비라핀, 데라비르딘, 라미부딘, 지도부딘, 스타부딘, 아바카비르, 디다노신, 잘시타빈 등)과 병용시 이러한 항레트로바이러스약의 치료효과가 떨어지고 내성이 발현될 수 있다.
   2) 쿠마린계 항응고제(펜프로쿠몬, 와파린 등), 면역억제제(사이클로스포린, 타크롤리무스수화물 등), 강심약(디기톡신, 디곡신, 메칠디곡신 등), 기관지확장제(아미노필린, 콜린테오필린, 테오필린 등), 항부정맥약(아미오다론, 퀴니딘, 디소피라미드, 프로파페논, 리도카인 등), 항경련약(페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀 등), 항우울약(이미프라민, 아미트립틸린, 노르트립틸린 등), 항암제(사이클로포스파마이드, 타목시펜, 탁솔, 에토포시드 등)과 병용시 이러한 약들의 효과가 떨어질 수 있으므로 투여 시작시와 종료시 이러한 약들의 효과에 대한 신중한 모니터링 실시가 필요하다.
   3) 경구용 피임제(에치닐에스트라디올, 데소게스트렐, 노르에치스테론, 레보노르게스트렐 등)와 병용시 경구용 피임제의 효능 감소 및 부정성기출혈의 발현율이 증가할 수 있다.
   4) 선택적 세로토닌재흡수저해제 등 관련 항우울약(시탈로프람, 플루옥세틴, 플루복사민, 파록세틴, 세르트랄린, 네파조돈 등), 편두통치료제(수마트립탄, 나라트립탄, 리자트립탄, 졸미트립탄 등)와 병용시 이러한 약들의 부작용이 증가할 수 있다.
4. 임부 · 수유부에 대한 투여
   임부 및 수유부 투여에 관한 자료는 충분하지 않다.
5. 저장상의 주의사항
   소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

＊이미 유방암이나 자궁내막증(자궁경부암), 자궁근종을 가지고 있는 환자는 이약을 복용하지 않는 것이 바람직합니다.