K G M P
적격업체제품

산소를 공급하는 난치성 편두통 치료제

분류번호	217
전 문 의 약 품	

헤 펜 캡 슐

(염산플루나리진)

사람이 생활을 하다보면 많은 빈도의 두통을 경험하게 되며 이러한 증세가 오랫동안 반복되면 무서운 질환과 관련지으려는 경우가 흔히 있습니다. 다행히 두통의 원인중 대부분은 혈관이상에 따른 편두통과 근육 수축에 의한 긴장성 두통이 가장 흔한 원인이 됩니다.

편두통을 유발하는 내·외적인 요인은 주로 stress와 음식, 약물이지만 여성의 생리전이나 배란시 또한 햇빛이나 운동에 의해 나타나기도 합니다. 전형적인 편두통증상은 두통이 있기전 눈이 아물거리거나 지그재그선이 보이며 시력장애가 있다가 극심한 두통이 한쪽머리에 생기며 경우에 따라 오심, 구토 증상이 동반되고 눈에도 통증이 생기거나 눈알이 빠지는 듯한 증상이 수반됩니다. 이러한 격렬한 두통 시기 후에는 둔한 두통이 있다가 깨끗이 사라져 때로는 꾀병으로 오인받기 쉽습니다.

또한 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 다년간 진통제를 복용하고 있는 두통환자의 대부분은 편두통 무리에 속한다고 하여도 지나친 말은 아닌 것입니다.

헤펜캡슐은 두뇌혈관에 신선한 산소를 공급하여 중증의 난치성 편두통이나 전정계의 기능성 장애에 의한 어지러움을 치료하여 맑은 정신을 유지시켜 드릴 것입니다.

【성 상】

백색~유백색의 가루가 든 상부 흑색, 하부 적색의 경질캡슐제

【성분 · 함량】 1캡슐 중

염산플루나리진(식약청 고시) ····· 5.9 ㎎
(플루나리진으로 5 ㎎)

【효능 및 효과】

1. 중증의 난치성 편두통
2. 전정계의 기능성 장애에 의한 어지러움

【약리 및 특징】

1. **헤펜캡슐**은 뇌로의 혈류량을 증가시키고 뇌대사를 개선시켜 뇌졸중의 예방, 이명, 현훈 등에 사용되며 특히 난치성 편두통에 효과가 있습니다.
2. **헤펜캡슐**은 다른 일반적인 진통제와는 달리 편두통의 원인이 되는 뇌혈관으로의 Ca^{++}의 유입을 억제함으로써 뇌세포 손상을 예방합니다.
3. **헤펜캡슐**은 허혈상태에서의 세포손상에 대한 예방효과와 혈소판의 파괴방지와 부종예방 효과가 있어 혈소판에 의한 뇌혈관경련을 막아주어 편두통을 치료하여 드립니다.
4. **헤펜캡슐**은 기존에 사용되던 Methysergide와 같은 편두통약보다 우수한 효과를 지녔으며 어지러움증은 항히스타민제나 Promethazine보다 유용하게 사용됩니다.
5. **헤펜캡슐**은 여러가지 원인 즉 공해, 고산 stress, 동맥경화, 심한 운동, 호르몬의 변화에 의한 뇌혈관의 저산소 상태로 유발되는 편두통, 현기증, 이명, 집중력결핍, 정신혼란 증상에 우수한 효과가 있습니다.

【용법 · 용량】

1. 중증의 난치성 편두통
   초회량 : 플루나리진으로서 1회 10 ㎎을 65세 미만의 성인은 1일 1회(65세 이상은 1회 5 ㎎) 저녁에 경구 투여한다. 만일 우울증, 추체외로증상, 기타의 심한 부작용이 나타나거나 2개월간 투여후에도 증상이 개선되지 않을 경우에는 투여를 중지한다.
   유지량 : 유지요법이 필요한 경우, 2일마다 이 약으로 1회 10 ㎎(65세 이상은 1회 5 ㎎)을 투여하거나 1주일에 5일간 1일 1회 10 ㎎(65세 이상은 1회 5 ㎎)을 투여(2일간은 휴약)하는 등 감량 투여한다. 또한 편두통 예방을 위한 유지요법으로 편두통 증상이 나타나지 않더라도 초회투여 6개월 이후에는 투여를 중지하여야 하고 증상이 재발되는 경우에 한하여 초회량부터 다시 투여한다.
2. 전정계의 기능성장애에 의한 어지러움 : 편두통에 대한 용법·용량과 동일하나 초회량은 어지러움 증상의 조절에 필요한 기간(일반적으로 2개월) 이상 지속하여서는 안된다. 또한 만성 어지러움인 경우 1개월, 발작성 어지러움인 경우 2개월간 복용하여도 뚜렷한 증상의 개선이 없는 경우에는 투여를 중지한다.
   연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

➜ 뒷면을 참조하십시오.

※〔최신 제품 정보확인 방법〕 : 이 첨부문서 개정일자(2004. 9. 14) 이후 변경된 내용은 아래에 표시된 홈페이지나 고객상담실을 통하여 확인할 수 있습니다.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다. (최초 작성일자: 1997. 9. 22)
(개정일자: 2004. 9. 14)

제조발매원
JIN YANG PHARM.CO.
진양제약주식회사
본사 : 서울특별시 서초구 서초3동 1532-9 (T:(02)3470-0300)
공장 : 경기도 안산시 단원구 초지동 649-3 (T:(031)494-8196)
고객상담실 : (02)3470-0350 홈페이지 : www.jinyangpharm.com

【포 장 단 위】

100캡슐(병), 1000캡슐(병)

【저 장 방 법】

밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 두개내 출혈후 완전히 지혈되지 않은 환자
2) 급성 심근경색 환자
3) 파킨슨병 환자
4) 우울증상 또는 그 병력이 있는 환자
5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인

2. 다음 경우에는 신중히 투여할 것

1) 간장애 환자
2) 고령자

3. 부작용

1) 정 신 신 경 계 : 우울증상이 나타날 수 있으므로 환자의 상태에 충분히 주의하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
2) 추체외로증상 : 경련 및 운동기능감소증, 가면모양의 얼굴, 전경전굴(前傾前屈) 자세, 입술이상운동증, 진전, 경직, 보행장애 등의 추체외로증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
중증인 경우 항파킨슨제를 투여하는 등 적절한 처치를 한다.
3) 간 장 : 드물게 AST, ALT, ALP, LDH 상승 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지한다.
4) 과 민 증 : 드물게 발진이 나타날 수 있으므로 환자의 상태에 충분히 주의하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
5) 소 화 기 계 : 드물게 구갈, 위부불쾌감, 변비, 구역, 식욕부진, 설사 등이 나타날 수 있다.
6) 기 타 : 때때로 졸음, 피로, 드물게 무력감, 권태감, 두통, 어지러움, 비틀거림, 불면, 안면홍조, 체중증가, 부종, 요폐, 유즙분비과다 등이 나타날 수 있다(유즙분비과다의 경우 경구용 피임제를 병용하는 여성에게서 많이 나타날 수 있다).

4. 일반적 주의

1) 이 약 투여중에 운동기능감소증, 가면모양의 얼굴, 전경전굴(前傾前屈) 자세를 주로하는 추체외로증상 또는 우울증상이 될 수 있다(여성에 많다는 보고도 있다).
투여 중지후 수개월에 걸쳐 이러한 증상이 나타날 수 있으므로 다음 사항에 주의한다.
① 이 약 투여중에는 환자의 상태를 충분히 관찰하고 추체외로증상, 우울증상의 조기발견에 주의하며 이러한 증상이 의심되거나 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지한다.
② 추체외로증상이 나타난 예에 있어서는 계단을 오르내리거나 옷을 입고 벗는 등의 일상생활 동작이 악화될 수 있으므로 충분히 관찰한다.
③ 이 약 투여 시작후 약 2개월에 효과판정을 하고 그 이후 투여에 대해서는 다음과 같이 한다.
- 효과가 인정되는 경우 : 정기적(약1개월 정도)으로 효과를 확인하고 투여여부를 결정한다.
- 효과가 인정되지 않는 경우 : 중지한다.
- 효과판단이 서지 않을 경우 : 일시 휴약하고 병의 상태를 충분히 관찰한 상태에서 투여 여부를 결정한다.

2) 졸음, 무력감 등을 일으킬 수 있으므로 이 약 투여중인 환자에는 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계 조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

1) 혈압강하제와 병용투여할 경우 혈압강하제의 용량을 조정하는 것이 바람직하다.
2) 알코올, 신경안정제 또는 수면제와의 병용투여에 의해 과도한 진정작용이 나타날 수 있으므로 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물시험(마우스)에서 기형발생(골격이상)이 보고되었으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다.
2) 수유중에는 투여는 피하고 부득이한 경우에는 투여를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 없다).

8. 고령자에 대한 투여

추체외로증상, 우울증상이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여한다.

9. 과량투여시의 처치

과량투여에 의해 진정, 흥분, 빈맥 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 위세척 등 적절히 처치하고 필요에 따라 활성탄을 사용한다.