

진양 아시클로버 200mg 400mg 정

【성분 · 함량】 1정중

아시클로버 (U.S.P) 200 · 400mg

【성 상】

주홍색의 원형정제

【약리 · 특징】

1. 아시클로버는 단순포진 바이러스(Herpes Simplex Virus) 수두 및 대상포진 바이러스(Varicella Zoster Virus)에 대하여 높은 감수성을 나타내는 항 Virus 제제입니다.
2. 아시클로버는 헤르페스 감염세포에 들어가 3인산 아시클로버로 되어 DNA 합성을 억제하여 Virus성 DNA의 증식을 막아줍니다.
3. 아시클로버는 포유류에 대한 독성이 낮으며 정상세포 합성과정에는 영향을 미치지 않습니다.

【효능 · 효과】

1. 초발성 및 재발성 생식기 포진을 포함한 피부 및 점막조직의 단순포진 바이러스 감염증의 치료 및 예방
2. 대상포진 감염증의 치료, 특히 급성기의 통증에 효과가 있다. 반면 포진후 신경통에 대한 효과는 아직 증명되지 않았다.
3. 2세 이상 소아의 수두치료

【용법 · 용량】

〈성 인〉

1. 단순포진 바이러스 감염증의 치료
 - 1) 1일 5회, 1회 아시클로버로서 200mg씩 취침시간을 제외하고 약 4시간 간격으로 복용한다.
 - 2) 투여는 5일간 계속하며, 중증 초발성 감염증의 경우 치료를 연장해야 한다.
 - 3) 중증 면역기능저하 환자(골수이식후 등) 또는 소화관 흡수장애 환자에는 1회 아시클로버로서 400mg까지 증량하거나 정주요법으로 바꿀 수 있다.
 - 4) 투여는 감염후 빠를수록 좋으며, 재발성인 경우 전구증상이나 병변이 처음 나타날 때 투여하는 것이 좋다.
2. 면역기능이 정상인 환자의 단순포진 감염증의 예방
 - 1) 1일 4회, 1회 아시클로버로서 200mg씩 약 6시간 간격으로 복용한다.
 - 2) 1일 2회, 1회 아시클로버로서 400mg씩 12시간 간격으로 복용할 수도 있다.
 - 3) 용량추정은 1회 아시클로버로서 200mg을 1일 2~3회 투여해 봄으로써 유효성을 더 정확히 알아낼 수 있다.
 - 4) 장기치료 환자에게 계속적 억제기능의 유무를 재평가하기 위해서는 매 6~12개월 간격으로 주기적으로 치료를 중단해야 한다.
3. 면역기능이 저하된 환자의 단순포진 감염증의 예방
 - 1) 1일 4회, 1회 아시클로버로서 200mg씩 약 6시간 간격으로 복용해야 한다.
 - 2) 중증 면역기능저하 환자(골수이식후 등) 또는 소화기관 흡수장애 환자에는 아시클로버로서 400mg까지 증량하거나 정주요법으로 바꿀 수 있다.
 - 3) 감염위험 기간 동안 투여한다.
4. 대상포진 감염증의 치료
 - 1) 1일 5회, 1회 아시클로버로서 800mg씩 취침시간을 제외하고 약 4시간 간격으로 복용하며, 투여는 7일간 계속한다.
 - 2) 중증 면역기능저하 환자 또는 소화관으로부터 흡수가 잘 안되는 환자의 경우 정맥주사가 좋다.
 - 3) 투여는 감염후 빠를수록 좋으며, 발적이 나타난 후 빨리 치료하면 할수록 더 좋은 효과가 나타난다.

〈소 아〉

1. 단순포진 감염증의 치료 및 면역기능이 저하된 환자의 단순포진 감염증의 예방
 - 1) 2세 이상 : 성인에 준함.
 - 2) 2세 미만 : 성인용량의 1/2을 투여함.
2. 면역기능 정상 환자의 단순포진 바이러스 감염증의 예방에 대한 확실한 자료는 아직 없다.
3. 2세 이상 소아의 수두치료

1회 체중 kg당 아시클로버로서 20mg(800mg을 초과하지 않도록) 1일 4회 5일간 투여한다. 치료는 수두발진이 나타난 후 빠를수록 좋으며 가급적 발진후 24시간 이내에 투여한다.