

일반의약품
분류번호314

ROVITAL 로비탈 연질캡슐

중년기가 되면 혈액 순환이 잘 되지 않아 수족 냉증, 수족 저림 등의 증상이 나타나기 쉬우며 갱년기로 인한 어깨결림, 두통, 두증, 불면의 증상도 출현하기 쉽습니다. 로비탈 연질캡슐은 로알젤리, 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E가 이상적으로 배합되어 갱년기 장애, 말초혈행장애로 인한 수족냉증, 수족저림의 개선 효과가 우수하며 육체피로나 임신·수유기 영양보급에도 좋습니다.

■원료의약품 및 분량 : 1캡슐 중

로알젤리(식약청고시)	20mg
(10-히드록시-2-데케노인산으로서 0.8mg)	
초산토코페롤(약전)	45mg
(비타민E로서 45I.U.)	
아스코르빈산(약전)	100mg
엽산치아민(약전)	5mg
리보플라빈(약전)	2mg
엽산피리독신(약전)	5mg
시아노코발라민(약전)	12μg
니코틴산아미드(약전)	40mg
건조난백분말(별규)	200mg외 첨가

■성상

황갈색의 유상물이 든 양면 적갈색의 연질캡슐제

■효능·효과

이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화
 - 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증
- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E의 보급
 - 육체 피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기

■용법·용량

1일 1~3회, 1회 1캡슐씩 복용합니다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부, 수유부
3. 부작용
 - 1) 이 약 투여에 의하여 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 설사, 묽은 변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있습니다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 3) 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용합니다.
5. 상호작용
이 약을 투여할 경우에는 레보도파 함유 약물과 병용투여하지 않습니다.
6. 임상검사치에의 영향
 - 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
7. 저장시의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

■저장방법

밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

- * 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서 작성일(2007년 10월 08일)이후 변경된 내용은
당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)의 제품소개에서 제품명을 클릭하거나
소비자 상담실(전화번호 : 080-611-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인 할 수 있습니다.

제조원
(주)동구제약
본사 : 서울특별시 구로구 고척2동 185-2
공장 : 경기도 화성시 향남읍 양산리 901-3

판매원
(주)유한메디키
충북 청원군 오창읍 양청리 807-1