일반의약품
분류번호 : 114

비스테로이드성 소염진통제

클리신정

(클로닉신리신)

우수의약품
KGMP
적격업체 제품

클리신정은 비스테로이드성 소염 진통제로서 종래의 약물에 비해 소염 진통작용이 강하면서도 소화관 점막에서의 궤양발생율이 낮으며 내약성이 매우 좋고 독성이 낮아서 치통, 두통, 관절통, 월경통 뿐만 아니라 수술후 심한 통증에도 권장되는 약물입니다. Extra 약전 "Martindale"에 보면 클로닉신은 600밀리그람 투여시 모르핀 10밀리그람을 주사한 것과 같은 진통효과를 가지며, 구역, 현운, 졸음, 두통등 경미한 부작용 외에는 거의 부작용이 없는 대표적 소염진통제로 소개하고 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정중
클로닉신리신(식약청고시 제98-127호) ·····125밀리그람



$C_{19}H_{25}C1N_4O_4$ 408.88

【성 상】 백색의 원형제피 정제

【효능 · 효과】
다음 질환에 사용할 수 있다.
류마티양 관절염, 근육통, 신경통, 외상후 · 수술후 동통, 두통, 치통, 이통, 월경통

【용법 · 용량】
성인 : 클로닉신리신으로서 1회 125~250밀리그람, 1일 3회 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1)소화성 궤양 환자
   2)이 약에 과민증 환자
   3)임부
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   소화성 궤양의 병력이 있는 환자
3. 부작용
   1)소화기: 장기투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장 출혈, 소화성 궤양 및 천공이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

2)기타: 때때로 구역, 현기증, 졸음, 두통, 식은땀, 한기, 다행증이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1)소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의한다.

2)만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.

①장기 투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 한다.

②약물요법 이외의 치료법도 고려한다.

3)급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.

①급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.

②원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피한다.

③원인요법이 있으면 그것을 실시한다.

4)환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의한다.

5)감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여한다.

6)다른 소염진통제와 병용은 피하는 것이 바람직하다.

7)고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의한다.

5. 상호작용

이 약은 혈액응고에 영향을 주지 않으므로 혈액응고와 관련한 용량조절은 필요하지 않다.

6. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

원진제약(주)
경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4
소비자상담: 031)494-3646

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.