

龍 鼻 錠

용비정

사람의 코는 공기를 호흡하는 비강(콧속)과 비강에 연결된 네개씩의 공동(작은 8개의 둥굴 모양의 공간)이 있는데 이곳을 부비강이라고 합니다. 이곳은 얇은 점막으로 덮혀있고 여기에 리소자임이라는 효소가 나와서 외부에서 침입하는 세균을 살균하며 알맞은 습도를 유지해 줍니다. 감기에 걸리거나 알러지증상이 일어날때는 콧물을 많이 흘리게 되고 잘 치료하지 않으면 농증이 되어 부비강속에 고이게 되는데 이것이 소위 축농증입니다. 그 외에도 코에 생기는 질환으로 비후성비염, 알러지성 비염, 코에 점액분비가 많아지는 비카타르, 콧속의 충혈등에 의한 비폐색, 코속에 딱지가 생겨 악취가 나는 취비증 등이 있습니다.

용비정은 콧속에 생긴 농을 빼내는 한방약 배농산급탕 처방을 중심으로 하고, 비강질환에 귀하게 쓰이는 신이, 비파와 폐기운을 높여주는 맥문동, 승마 등등을 배합하였으며 흥부(가슴부위)에 생기는 열을 내릴 수 있도록 석고, 황금, 치자, 시호 등을 첨가한 이상적인 처방의 순수 한방생약제입니다.

<주성분의 약리작용>

길경, 감초, 작약,
대추, 지실, 건강

배농산급탕 처방으로 콧속에 고인 농이나 농같이 짙은 콧물을 배출시킨다.

석고, 황금
치자, 시호

폐나 흥부 또는 위속에 생긴 열을 꺼주어 수분대사가 원활히 되게하며 콧속에 생기는 분비물을 억제한다.

맥문동, 승마
지모, 창출

폐에 기운을 넣어주고 몸속의 기를 잘 돌게하며 몸속의 습을 제거한다.

신이, 비파엽

코막힘이나 점액성 비축과다 등을 치료하고 축농증을 치료하는 희귀약재로 쓰이고 있다.

[원료약품 및 그 분량] 1정중

용비정건조엑스(별규)400밀리그램

길 경(약전)	666.66mg	황 금(약전)	33.32mg
감 초(약전)	500.00mg	창 출(약전)	33.32mg
작 약(약전)	500.00mg	치 자(약전)	33.32mg
대 추(약전)	500.00mg	시 호(약전)	33.32mg
지 실(약전)	333.32mg	승 마(약전)	33.32mg
건 강(약전)	333.32mg	지 모(약전)	33.32mg
석 고(약전)	333.32mg	맥문동(약전)	33.32mg
신 이(생규)	333.32mg	비파엽(생규)	33.32mg

[성 상] 담갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 축농증, 부비강염, 비카타르, 비폐색, 취비증

[용법·용량] 성인 1회 2~3정, 15~8세 1정씩, 1일 2회 조식, 공복시에 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1)혈압이 높은 환자 또는 고령자
 - 2)심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
 - 3)부종이 있는 환자
 - 4)의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1)본체의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 설하가 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
 - 2)위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 3)근병증: 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
- 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 푸로제 이노제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드제 이노제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위

작성일: 2005. 11



한국웨일즈제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4

소비자상담실: 031)494-5995

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 소비자상담실로 문의하시면 확인할 수 있습니다.