

파마 메코발라민정

※ 본품(의약품)을 사용하시기 전에 첨부문서의 내용을 주의깊게 읽어보시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

■성상

적색의 원형 당의정

■원료약품 및 분량 1정중

메코발라민(J.P) 0.5mg

■효능 및 효과

말초성 신경장애

■용법 · 용량

성인 : 메코발라민으로서 1일 1,500 μ g을 3회 분할하여 복용한다.

■사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
이 약 및 이 약에 포함된 성분예의 과민반응 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 임부 · 수유부
 - 클로람페니콜, 아미노글리코사이드 등을 비롯한 대부분의 항생제, 메토틱세이트, 피리메타민, 콜키신, 페니토인, 페노바르비탈, 프리미돈, 파라아미노살리실산을 복용 중인 환자(바람직하지 않는 상호작용을 일으킬 수 있다.)
 - H₂ 수용체 길항제를 장기복용 하는 환자(비타민 B₁₂의 결핍을 초래할 수 있다.)
 - 2주 이상 과량의 알코올을 섭취한 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 식욕부진, 구역, 설사
 - 발진
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 수은 및 수은화합물을 취급하는 직업종사자에게 장기간 대량 투여하는 것은 피하는 것이 바람직하다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
 - 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않을 것.

■저장방법 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

• 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는
오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

• 제품문의처 : 02)558-1277(마케팅부)

• 작성년월일 : 2005. 02. 14

MCB06-01