

●제산 및 완화제

일반의약품

분류번호:234

마그오 캡슐 250mg

(산화마그네슘)

※ 본품(의약품)을 사용하시기 전에 첨부문서의 내용을 주의깊게 읽어보시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

【성상】 백색분말이 충전된 상,하 백색 경질캡슐제

【원료약품 및 분량】 1캡슐중.

산화마그네슘(약전) 250mg

【효능 및 효과】

1. 주효능 효과

- 1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다.
- 2) 변비증.

【용법 및 용량】

성인 - 1) 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다: 산화마그네슘으로서 1일 0.5~1g을 수회 분할 경구 투여한다.

2) 변비증: 1일 2g을 1-2회 분할 경구 투여한다.

연령,증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 신장애 환자 (심한 신기능장애 환자에서 고마그네슘 혈증이 나타날 수 있다.)
- 2) 설사 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 심기능 장애 환자
- 2) 고마그네슘혈증 환자

3. 부작용

- 1) 소화기계: 때때로 설사등이 나타날 수 있다.
- 2) 대사이상: 장기 대량투여에 의하여 고마그네슘혈증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 휴약등 적절한 처치를 한다.

4. 일반적 주의 : 마그네슘 중독증상이 나타나면 칼륨염을 주사한다.

5. 상호작용

- 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
- 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH상승에 의해 병용 약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 3) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용시 우유 알칼리 증후군 (고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

6. 저장상의 주의사항

공기중에서 습기 또는 CO₂를 흡수하므로 보관에 주의한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

● 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

●제품문의처 : 02)558-1277(학술개발부)

●작성년월일 : 2003.10.25

MGE 03-01