

500캡슐

【성상】 흰색분말이 든 상부-연녹색, 하부-흰색의 경질캡슐제

【원료약품 및 분량】 1캡슐(660mg)중

산화마그네슘(약전) .....500mg

【효능 및 효과】

1. 주효능 효과

- 1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다. 2) 변비증.

【용법 및 용량】

성인 - 1) 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 산화마그네슘으로서 1일 0.5~1g을 수회 분할 경구 투여한다.

2) 변비증: 1일 2g을 1~2회 분할 경구 투여한다.  
연령,증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 신장에 환자 (심한 신기능장애 환자에서 고마그네슘 혈증이 나타날 수 있다.) 2) 설사 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 심기능 장애 환자 2) 고마그네슘혈증 환자

3. 부작용


1) 소화기계: 때때로 설사등이 나타날 수 있다.

2) 대사이상: 장기 대량투여에 의하여 고마그네슘혈증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 휴약등 적절한 처치를 한다.

제산 및 완하제

마그오 캡슐500mg

(산화마그네슘)



4. 일반적 주의: 마그네슘 중독증상이 나타나면 칼륨염을 주사한다.

5. 상호작용

1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.

2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관 내 체액의 pH상승에 의해 병용 약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.

3) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용 시 우유 알칼리 증후군 (고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

6. 저장상의 주의사항

공기중에서 습기 또는 CO<sub>2</sub>를 흡수하므로 보관에 주의한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30°C) ●주의-부작용

제조번호 :

사용기한 :

● 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색, 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

● 제품문의처 : 02)558-1277(마케팅) 제작년월일 2006. 07. 24 MGR06-010

